

A V I U M
SPECIES NOVAE,
QUAS
IN ITINERE PER BRASILIAM ANNIS MDCCCXVII — MDCCCXX
JUSSU ET AUSPICIIS
MAXIMILIANI JOSEPHI I.
B A V A R I A E R E G I S
SUSCEPTO
COLLEGIT ET DESCRIPSIT
Dr. J. B. de SPIX,

Ordinis Regii Coronae Bavariae civilis Eques, Academiac scientiarum Bavariae Socius ordinarius, Musei Regii zoologici, zootomici et ethnographici Conservator, Academiae Naturae Curiosorum, Societatis literariae Edinburgensis, Moscoviensis etc. Sodalis.

TABULAE CXV. A M. SCHMIDT MONACENSI DERICTAE.

MONACHII
TYPIS FRANC. SERAPH. HÜBSCHMANNI.

MDCCCXXIV.

AUGUSTISSIMAE AC SERENISSIMAE
PRINCIPI AC DOMINAE,
DOMINAE
FRIDERICAE GUILIELMÆ
CAROLINÆ
BAVARIAE REGINÆ

SACRUM.



CATHARTES Papa *Femina*.
Le Roi des Vautours Femelle

Tab I.

A V E S.

F a l c o n e s.

Carnivoii, rapaces, diurni, haud migratori, raro familiares, in arboribus et locis petrosis altis nidificantes, ramos ad nidum construendum ope unguium sublevantes, mares foeminius frequenter minores; pennis corporis non molibus, fuscioribus; capite crasso; rostro exerto, ad basin cera tecto, ad apicem adunco; oculis praegrandibus, lateralibus; palpebris pilosis; collo minus contracto; pedibus robustis, frequenter non altis et modo ad tarsi apicem plumosis, reliquis squamosis; digitis tribus anticis, praecipue externo haud versatili, subpalmatis, postico libero; unguibus validis, falcularibus; ventriculo membranaceo, molli.

G E N U S I. C A T H A R T E S.

Habitu vulturino; capite erasso, praecipue collo exerto pectoreque medio nudiusculis; rostro ad basin elongato, recto, apice intumescente, gibbo, edentato, subadunco; naribus oblongis, longitudinalibus, largis; rictu oris ab oculis remoto; alis vix cruciatis, caudam subaequantiibus; tarsis reticulatis; digitis longissimis, robustis.

S P E C I E S I. C A T H A R T E S P A P A. T A B. I. F o e m i n a.

Mas. Corpore supra et subtus ochraceo albo; remigibus rectricibusque nigerrimis; caruncula supra nares maiore, triquetra; collari circulari, infumato; colore rostri collique maris sanguineo.

Foem. Corpore supra et subtus fusco nigricante; tectricibus alarum fuscescentibus; abdomine femoribusque nigricantibus albidisque; caruncula nasali minore, vix divisa; collari longiore, fusco nigricante, colore rostri collique magis rubro fusco; tarso minore.

D E S C R I P T I O. Corpus robustum magnitudine fere anseris; caput supra in medio, ad genas, ad basin rostri maxillaeque inferioris nudum, postice et versus nucham, inter et ante oculos auresque, supra frontem nigro pilosum; caput, rostrum collumque nuda, sanguinea; rostrum supra nares carunculatum, ad basin integumenti cornei nigrofasciatum; oculi argentei; alae longae, caudam subaequantes, vix cruciatae; cauda mediocris, aequalis; pectus intermedium nudum; tarsi squamulis reticulati, flavicantes; digiti longi, robusti, supra scutellati; unguis validi, compressi, adunci, nigri.

Mas foemina haud minor differt ab hac dorso, tectricibus alarum, alis subtus, pectore, abdomine, crisco, femoribus ochraceo-albis, remigibus ad marginem vexilli externi albo limbatis, rectricibus nigerrimis, chalybeo subreluentibus, collari minore, canescente, supra et postice nigro, caruncula nasali maiore, triquetra. Longitudo corporis a rostri apice usque ad caudae finem 2³, 2', rostri ab apice usque ad frontem 2¹', caudae 8¹', partis caudae alas superantis 1¹2', tarsi 5¹2'.

Habitat in sylvis montosis arboribusque altis interioris Brasiliæ, „Urubu Rey“ dictis, cadavera odoratu longinque investigans, praesertim oculos animalium mortuorum appetens, reliquum corpus Cathartibus Auris gregarie subsequentibus ad comedendum relinquens. Specimina tria in museo monacensi asservantur. Mascul. 2. Foem. 1.

SPECIES 2. CATHARTES AURA. BURR. pl. 187.

Niger, capite colloque nudis, nigrofuscis; collo longiore; collari longiore, supra profunde emarginato; rostro longiore, supra frontem non gibbo, apice albo, subintumescente, minus adunco; cauda breviore.

D E S C R I P T I O. Corpus ansere duplo minus, supra nigrum, subtus fuscescente nigrum; caput supra planiusculum, nudum, subpilosum; rostrum elongatum, rectum, nigrum, apice albicans, subintumescent, triquetrum, subaduncum; nares longitudinales, inter oculos et intumescentiam fere intermediae; rictus oris usque ad oculos prolongatus; oculi brunnio nigri, ab angulo oris minus distantes; collum nudum, rugosum, fusco nigricans; collare largum, non circulare sed postice versus occiput parum ascendens; alae subtus postice lividae, antice nigræ; remiges primarii brunnescentes, caudæ apicem attingentes, scapis flavo-albidis, secundarii nigri; cauda breviuscula, nigra, aequalis; abdomen, femur crissumque fusco nigra; tarsus totus nudus, reticulatus, niger; digitus medius longissimus; unguis compressi, nigri, subgraciles, posticus brevissimus. Longitudo corporis 1° 9', caudæ 7', tarsi $2\frac{3}{4}'$, rostri $2\frac{2}{3}'$

Habitat gregarius et familiaris prope domicilia incolarum in confinibus interioris Brasiliæ, odore carnis suæ gravis, animalia mortua omnis generis devastans.

SPECIES 3. CATHARTES RUFIGOLLIS. Catesby. TAB. 6.

Fusco violaceoque niger; capite gibbosiore, rubro; rostro minus elongato; naribus ab oculis remotissimis apicique rostri nigro proximis; oculis ab angulo oris magis dissitis; collo tarsoque brevioribus; collari brevi, non ascendentे sed circulari; cauda longiore, subtus flaviçante-cinerea; scapis remigum ferrugineis.

D E S C R I P T I O. Corpus præcedente vix minus, supra et subtus fuscescenti nigrum; caput nudum, præcipue supra nares gibbum, rubicundum; collum abbreviatum, antice nudum, postice sublanuginosum; collarē circulare, breve, nigrum; dorsum, alae, caudaque violaceo nigra; tectrices alarum fuscae; alae subtus argenteae; remiges primarii



POLYBORUS Caracara.

Le grand Caracara.

Tab. I.^o

longi, hirundinacei, violaceo-brunneo subreluentes scapis rufis, secundarii vexillo exteriore violaceo-nigro renitente, interiore fusco brunneo; cauda longa, alis longior, supra nigra, subtus plumbeo-argentea; rostrum minus elongatum, pone nares gibbosum, apice intumescens, nigrum, trigonum, aduncum. Longitudo corporis 1° 11', caudae 10 $\frac{1}{4}$ ', part. caud. alas super. 2', rostri 2 $\frac{1}{3}$ ', tarsi 2 $\frac{1}{3}$ '.

Habitat sub nomine Urubutingae solitarius supra arbores interioris Bahiae et Piauhy. Sp. 1.

GENUS II. POLYBORUS.

Rostro aquilino, ad basin subelongato, recto, ad latera compresso, ad marginem non sinuato, vix dentato, breviter adunco, membrana cerea ad genas, nares, infra et ante oculos nuda; naribus elevatis, ellipticis, subobliquis; rictu oris usque infra oculos prolongato; alis longis, eruciatis, caudam sublongam subadæquantibus; tarsis squamosis.

SPECIES 1. POLYBORUS VULGARIS. Vieillot. TAB. I^a. Juvenis.

I. Brasiliensis. Lath. Cheriway. Jacquin. TAB. XV adult. Caracara. Azara.

Majusculus, fusconiger; capite supra nigro, postice suberistato; malis gulaque albescensibus; collo, dorso, pectore caudaque fulvo nigroque fasciatis; cauda apice nigro fasciata.

Juvenis(?) Fusceens; collo ochraceo; dorso, pectore et abdome bruno-fuseis, fulvo striatis; alis cauda sublongioribus; tarsis altioribus, robustioribus.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine fere anseris; caput supra nigrum, postice suberistatum, infra et ante oculos nudum. Cera nuda flava; rostrum elongatum, rectum, lateraliter compressum, ad marginem haud sinuatum, apiceque vix dentatum, breviter aduncum, canescens; oculi rubrogrisei; nares elevatae, ellipticae, oblique, a fronte longe distantes; gula malaeque albescentes; collum superius ochraceo album, nigropunctatum, vel fasciatum, inferius, pectus dorsumque nigro fulvoque undulata, plumbis nigro 5-fulvo 6-fasciatis, apice fulvo marginatis; abdomen et femora nigra; alae supra et infra nigrae; tectrices alarum posteriores fuscescentes; remiges nigri, medio supra et infra albo maculati vel fasciati, caudam subaequantes; cauda fulvo albicans, nigro 11-undulata, apice large nigro fasciata; crissum et uropygium fulvescentia, nigro fasciolata; pedes flavicantes, squamosi; unguis nigri, apice acute falculares. Specimina descripta duo reperta sunt in cæmpis Minas Geraes, bobus insidentia insectaque e cute extra-hentia, vulgo Cracra dicta; specimina duo alia alis magis fuscescentibus, insignia in Capitania Piauhy occisa sunt.

Juvenis (forte species longe diversa) in Tab. I^a.. depictus, in museo exstat sexies a nobis repertus in insula St. Joannis (Marajo); differt a praecedentibus collo, pectore dorsoque non fulvo fasciolatis sed longitudinaliter strigilatis, capite fuscescente; cauda equidem aequo ochracea est nigroque fasciolata, apiceque fusco fasciata.

Longitudo corporis 1° 7 $\frac{1}{2}$, caudae 8', c. part. alas super. $\frac{3}{4}'$, tarsi 5', rostri 1 $\frac{3}{4}'$.

GENUS III. A Q U I L A.

Rostro e basi elongato, recto, membrana usque ad oculos nudiuscula vel pilosa teeto, lateraliter vix compresso, ad marginem sinuato, apiee unidentato, adunco; rictu oris usque infra oculos prolongato; naribus vel oblongis (aquilae europaeae) vel rotundis (americanae); collo subexerto; alis apice non acutis, caudam fere aequalibus; tarsis squamosis.

SPECIES I. AQUILA URUBUTINGA. TAB. I. Mas adultus.

Majuscula nigra, juvenis fusco-rubo maculata; cauda media alba, ad basin et apicem nigro fasciata, alboque marginata; remigibus nigris, medio cinereo fasciatis. — Foemina et juvenis tectricibus alarum subfusciscentibus; abdomine femoribusqne nigris, ferrugineo maculatis; cauda albo nigroque maculata, apice nigro fasciata alboque marginata.

DESCRIP^TIO. Corpus robustum, praecedente parvum maius, supra et subtus in adultis nigerrimum, in foemina fuliginoso nigrum, in junioribus nitro fuliginosum, fulvo-, praesertim ad collum, pectus, abdomen, femora, medio ad remiges varie maculatum; rostrum subvalidum, basi et ante oculos subpilosum, flavicans, apice nigrum, aduncum, in adultis dentatum; nares subrotundae, patulae; alae canda nonnihil minores, nigrae; tectrices alarum nigricantes, subfusco marginatae; remiges supra et subtus niger-rimi, medio canescenti subfasciati, in foemina remiges tres exteriores ad basin albofasciati, in junioribus medio ferruginei, nigro tenuerrime fasciati; femora et crissum in adultis nigra vel nigricantia, in junioribus fuliginosa, fulvo maculata; cauda medioocris, aequalis, in adultioribus medio alba, basi nigra, apice large nigro fasciata, fulvo-albo marginata, in junioribus medio albescens vel fulvescens, nigro undulata vel maculata; tarsi sublongi, nudi, squamosi, flavicantes; unguis nigri, subcylindrici, apice adunci, acuti. Specimen in Bahia repertum variat cauda cine-rascenti-fulva, medio nigro undulata vel maculata, ad radicem alba, ad apicem nigro fasciata fulvoque maculata, remigibus nigricantibus, tribus exterioribus medio ad vexillum externum albis, nigrofasciatis, reliquis ad vexillum internum ferrugineis, nigro



AQUILA Urubutinga ^{? Mus.}

S. Faucon des Rats.



AQUILA pieta

Tab. I^e



AQUILA milvoidea

Le Facon Pinima.

Tab. I^o

fasciatis, rostro nigro, edentato (Temminck. pl. 55). Longitudo corporis 1^o, 9', caudae 8', partis caudae alas superantis 5'

Habitat sub nomine „Gavião dos Ratos“ in sylvis Bahiae, Paraë. Specim.
„., quorum 3. nigra.

SPECIES 2. AQUILA PICTA. TAB. I^o

Majuscula, nigricans, rufo maculata; cauda longa, subacuta, alis praelongiorc, rufonigricante, nigro fasciolata, medio absque vitta alba nigraque, apice fulva, penicillata.

D E S C R I P T I O. Corpus Urubutingae statura nec non colore simillimum. Caput, collum, pectus abdomenque nigrosusca, rufo varie maculata, plumulis ad radicem fulvo-albis; dorsum nigrosuscinis; femora extrorsum nigricantia, plumulis rufo submarginalis, intorsum fulva, nigro fasciolata; crissum albosulvum, nigricanti maculatum; alae cauda perbreviores, supra nigricantes, subtus fulvescentes, antice nigro maculatae, postice nigro fasciatae; tectrices humeri superiores nigricantes, rufo marginatae, anteriores nigricantes, apice fulvo submarginatae, vexillo interno illoque secundariorum fuscorum rufo nigroque fasciolato; cauda longiuscula, subacuta, supra fusco nigricans, nigro frequenter fasciolata, subtus fulvescens, ad basin albicans, apice penicillata, penicillis brunneis, vexillo recticum exteriore cano nigroque fasciolato, interiore rufo nigroque fasciolato; rostrum basi flavum, apice nigrum; pedes flavi; unguis nigrus; oculi brunnei. Mas. An eadem cum Urubutinga juniore? Longitudo corporis 2^o, caudae 11½, c. partis alas exsuper. 5'.

Habitat sub nomine „Gavião pintado“ in insula Marajo passeres infestans.

SPECIES 3. AQUILA MILVOIDES. TAB. II

Majuscula, rufo-castanea; plumis corporis supra et subtus, scapis plumarum abdominalis longitudinaliter nigro striatis; capite nigrostrigilato gulaque fulvescentibus; collo antico infra nigro; cauda apice nigro large fasciata castaneoque marginata, postice rufa nigroque fasciolata.

D E S C R I P T I O. Corpus Urubutinga non nihil minus, supra et subtus rufo castaneum, plumulis capitatis, dorsi tectricumque alarum medio nigro strigilatis; caput, nucha et gula ochracea, scapis nigro strigilatis; collum anticum nigrum; pectus et abdomen rufo castanea, plumarum scapis nigricantibus; crissum et femora usque ad tarsum sere dimidium castanea; tectrices alarum rufocastaneae, scapis nigro strigilatis; remiges primarii nigerrimi, immacu-

lati, secundarii primi nigri, secundi medio nigro castaneoque fasciati, apice nigri, rufo-marginati, posteriores rufocastanei, vexillo interiore nigricante. nigro rufoque fasciato; cauda alis longior, apice nigro vittata fulvoque marginata, postice rufocastanea nigroque fasciata; tarsus tarso Urubutingae et Busonis brevior, squamosus, cinereo-flavicans; unguis nigri, subcompressi, falciformes; rostrum basi cinereo-flavicans, albopilosum, apice nigricans, maxilla inferiore postice albicante; oculi grisei. Mas. Longitudo corporis 1°, 8', caudae 7', partis caudae alas superantis 2'

Habitat in sylvis fluminis Amazonum, vulgo Panéma dicta, piscibus vicitans. Parasitae d'Afrique Levaill. pl. 22. simillima; differt vero patria et corpore magis rufo, capite haud nigro, femoribus non sanguineis, ala media non nigra, remigibus secundariis nigro fasciolatis, cauda tota non fasciolata, rostro apice non flavo, colloque toto non nigro. Spec. 1.

SPECIES 5. AQUILA BUSON. Lath.

Falco rutilans. Lichtenstein. Levaill. pl. 21. Temminck pl. 25.

Majuscula, rufo castanea; capite castaneo, nigro longitudinaliter striato; collo corporeque subtus rufocastaneis, tenerrime nigro fasciolatis; remigibus nigris, medio castaneis; cauda nigra, medio et apice albo fasciata.

D E S C R I P T I O. Corpus magnitudine Urubitingae; caput castaneum, plumulis medio nigrostriatis; macula post aures fusca; macula subauricularis rufocinerea; collum, pectus, abdomen crissumque castanea, transversim nigro undulata; femora castanea, nigro subfasciata; dorsum cinerascenti fuscescens; tectrices alarum humerales rufae, mediae fusconigræ, rufo submaculatae apiceque castaneo terminatae; alae cauda maiores, cruciatae, subtus rufae, pone nigro fasciolatae; remiges rufo castanei, apice nigri, vexillo interiore castaneo nigroque fasciolato; cauda aequalis, nigra, medio albospectata, apice albonarginata; cera ante oculos nudiuscula, flava; nares subrotundae; rostrum edentatum, breviusculum, apice nigrum, aduncum; pedes flavicantes; tarsus altus, squamulosus; unguis subcompressi, nigri; oculi flavi. Longitudo corporis 1° 8', caudae 8½, partis alar. caudam superantis ½.

Habitat ad flumen Amazonum; mas foemina parum minor differt capite, collo pectoraque minus rufescens magisque cinereis, fasciolis abdominalibus latioribus, gula albescente, crasso, semore, tectricibus alarum humeralibus, remigibus medio nigrofasciatis; differt ab illo Levaillantii alis cauda non brevioribus, capite humeroque haud nigris, ab illo Temminckii dorso magis cinerascente, remigibus medio haud nigro fasciatis.



CYMINDIS Leucopygus.
Le Cyminde à croupien blanc

Tab. II



HARPYA bracata
Harpie à pantalon

Tab. III.

GENUS IV. CYMINDES.

Rostro graeillimo, basi breviusculo, constricto, nudo, apice subcylindrico, recto, hamato, ad marginem nec sinuato nec dentato; maxilla inferiore apice deflexa; rictu oris usque ad oculos prolongato; naribus posticis, rotundis; alis hirundinaceis, cauda sublongioribus; tarsis brevibus, semiplumosis.

SPECIES I. CYMINDES LEUCOPYGUS. TAB. II.

Mediocris, cinereo-nigricans; gula, abdomine et cauda brunnescens; crisso et cauda ad basin albis.

D E S C R I P T I O. Corpus corvinum, supra nigricans, subtus pallide brunnescens; caput, nucha et femora nigra; dorsum pectusque plumbeo nigricantia; gula abdomenque pallide brunnescens; crissum album; alae supra fusco-nigricantes, subtus cinereo nigrae; remiges primarii ensiformes, cruciati, nigricantes, caudam subsuperantes, secundarii fusconigri, fulvido marginati; cauda subaequalis, media anterior brunneofusca, apice albido marginata, posterior alba; rectrices exteriores medio magis albæ quam interiores, media impar nigra, apice albo marginata; rostrum basi et ante oculos nudum, flavum, reliquum nigrum; nares fronti proximæ; tarsus breviusculus, squamosus, fere semiplumosus; pedes oculique rubicundi; unguis nigri, semicylindrici, supra rotundati. Mas. Longitudo corporis 1°, caudæ $6\frac{1}{2}'$.

Habitat sub nomine „Thuüra“ ad flumen Amazonum; differt a Cyminde hamato Temminkii pl. 61. colore non plumbeo, abdomine crisso et cauda non plumbeis, cauda non abbreviata, ad radicem et apicem non nigra, alis cauda non brevioribus, naribus non oblongis. Spec. 1.

GENUS V. HARPYIA.

Rostro subelongato, subaquilino; alis abbreviatis; naribus ovatis, rectis; rictu oris usque ad oculos prolongato; cauda longa; tarsis totis dense plumosis.

SPECIES I. HARPYIA BRACCATA. TAB. III.

Majuscula, nigra; tarsis usque ad digitos dense plumosis, nigris, albo punctatis; uropygio nigro, albomaculato; cauda longa, nigro cineroque 4 vittata.

D E S C R I P T I O. Corpus subrobustum magnitudine Urubutingae, supra et subtus violaceo nigrum, plumis ad radicem albicantibus, medio fuscescentibus, apice violaceo nigris,

raro fusco marginatis; uropygium et crissum nigra, fulvo fasciata; alae cauda plus quam duplo breviores, subtus fulvo-albo fasciatae, antice fulvo maculatae; remiges omnes medio obscure fusco fasciati; cauda longa, supra nigro plumbeoqne, subtus nigro alboque 4 vittata, apice sordide fulvo terminata; pedes alti, usque ad digitos dense plumosi, fulvo-albo punctati vel fasciolati; cera digitique flavo-cinerrei; unguis crassi, subaduncii, nigri. Longitudo corporis 2⁹, caudae 11¹/2 c. partis alas superantis 7'.

Habitat in St. Paolo, „Coi no pretto“ nominata. Spec. 1.

SPECIES 2. HARPYIA ORNATA. Levaill. pl. 26.

Brunnescens; capite, crista occipitali pendula, dorso superiore humerisque nigris; collo rufo; pectore albo; abdomine albo, nigro maculato; hypochondriis albis, nigro fasciatis; femoribus et tarsis dense plumosis, albis, nigrofasciolatis; crasso albo, vix nigro maculato; alis supra fusco brunneis, subtus fulvo albis, nigro maculatis fasciatisque; remigibus obscure nigro fasciatis, vexillo secundiorum interiore albicante; cauda alis duplo longiore, supra brunnescente-livido nigroque, subtus albescente nigroque fasciata, apice livido marginata; rostrum apice nigricans; cera digitique flavo-cinerrei; unguis nigricantes, curvi, posticus longissimus. Longitudo corporis 1⁹ 10', caudae 10', c. partis alas super. 5', tars. 3¹/2'

Habitat, Corocuru nominata, ad flumen Amazonum. Sp. 1.

GENUS VI. ASTUR.

Rstro falcaneo, abbreviato, alto, lateraliter subcompresso, dentato, circa oculos nudo; naribus rotundis, largis, fronti approximatis; tarse breviusculo, squamulis reticulato; alis abbreviatis, dimidium caudae vix attingentibus; cauda elongata.

SPECIES 1. ASTUR CACHINNANS. TAB III^a.

Brunneus; capite, collo corporeque subtus albo ochraceis; fascia ab oculis et maxillis supra aures ad nucham nigra; cauda inaequali, nigra, fulvo maculata.

DESCRITIO. Corpus corace maius; caput crassum, ochraceum, supra oculos nigro-striatum, plumulis maris medio longitudinaliter nigro strigilatis, scutinae scapis nigris; vitta a maxilla et post oculos supra aures ad nucham nigra; gula, nucha inferior,



ASTUR cachinnans
L'astour rieur.



ASTUR cayennensis.

Tab. VIII. ♂

pectus, abdomen, femora, uropygium crissumque fulvo albicantia vel ochracea, scapis plu-
mularum brunnescensibus; alae supra nigrofuscae, subtus ochraceae, remigibus omnibus
medio fulvo nigroque fasciatis vexilloque interiore fulvescente; cauda alis tertia parte lon-
gior, inaequalis, supra nigricans, fulvo 5 subfasciata, apice fulvo terminata, subtus livido
nigroque fasciata; rostrum breve, altum, apice nigrum; cera flavicans, ante oculos
setis nigris munita; tarsi fortes, nudi, coerulecentes; unguis fortes, nigri; oculi
brunnei. Longitudo corporis 1° 7', caudae 8 $\frac{3}{4}$ ', c. part. alas super. 4', rostri 1'.

Habitat sub nomine „Cancan“ in sylvis campestribus Bahiae, Minas Geraes et
Para e, venatores voce garrula et longisona indicans. Serpentibus vietat; in eius ven-
triculo scilicet Bothrops fasciatus a nobis reperiebatur. Foemina, mare vix minor,
differt plumis capitis minus nigro strigilatis, tectricibus alarum anterioribus fusco rufoque
fasciolatis, posterioribus fulvo terminatis. Spec. 4.

SPECIES 2. ASTUR BRACHYPTERUS. Temmink pl. 141.

Fusconigricans supra, subtus albidissimus; vitta postauriculari nigra; collari albo; remigibus rectricibus-
que albo nigroque 5 fasciatis; cauda alis praelongiore, nigra, albo fasciata, inaequali, apice
albomarginata.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine Corvi; caput, alae et dorsum fusconigricantia;
rostrum breviusculum, subcompressum, basi pilosum, caerulecens, apice nigricanti
corneum, edentatum, aduncum; lora albicantia, nigro circumcineta; gula, collare,
pectus, abdomen, crissum senioraque albidissima; nucha inferior, dorsum et alae fusco-
nigricantia; alae subtus antice albae, postice nigro plumbeoque fasciatae; remiges bre-
ves, nigricantes, medio albo fasciati; uropygium nigrum, albomaculatum; cauda elongata, nigra, albo 4 fasciata, apice albomarginata, fasciis scapo non permeantibus; oculi
castanei; cera coerulecens; nares rotundae, anticae; pedes flavi; unguis acutus, nigrican-
tes. Mas. Longitudo corporis 1° 5', caudae 8 $\frac{1}{2}$, part. caudae alas superant. 5 $\frac{1}{2}'$.

Habitat in sylvis campestribus Bahiae; specimen Monachii reservatum ab illo
Temminkii differt cera, oculis et scapis plumarum albarum haud nigris.

GENUS VII. G Y M N O P S.

Rostro subelongato, gallinaceo, haud alto, subcylindrico, circa basin, praecipue ante oculos nudo, apice subaduncus, oblique descendente; naribus rotundis; collo exerto; tarsis breviusculis; alis cruciatis, cauda aequali vix brevioribus; unguibus compressioribus, gracilioribus.

SPECIES 1. GYMNOPS FASCIATUS. TAB. IV.

Niger, circa oculos, genas, nec non ad gulam nudus; cauda ad basin alba nigroque 5 fasciata.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine Cornicis, supra et subtus nigrum, pluuiis abdominis femorumque apice fulvo marginatis; caput nigrum, ante et infra, nec non pone oculos, ad genas, nares et gulam nudum, flavum, setis nigris obsitum; cera flava, extensa; nares minores, rotundae; maxilla superior nigricans, apice subadunca, inferior magis alta, albida; collum, dorsum et pectus nigra; abdomen crissumque fusconigra, plumis fulvo terminatis; remiges elongati, cruciati, supra et subtus nigri, versus radicem subalbidi; cauda alas transcendentia, fere dimidia anterior nigra, posterior alba, nigro 5 fasciata; pedes flavo cinerei; tarsus crassiusculus, superior squamulis reticulatus; unguis breviusculi, nigricantes, acuti; oculi flavorubri. Longitudo corporis 1° 5 $\frac{1}{2}$ ', caudae 3', partis alas super. 2'.

Habitat solitarius prope ripam fluminis Juru a, strigum modo volans. Sp. 1.

SPECIES 2. GYMNOPS STRIGILATUS. TAB. IV²

Fuscus; macula auriculari nigricans, colli laterali ferruginea; pectore abdomineque ferrugineis, brunneo striatis; alis caudaque medio albo-fulvo nigroque subfasciatis maculatisque.

DESCRIP^TIO. Corpus Coruice parum maius, supra et infra brunneo-rufescens; caput brunneofuscum, longitudinaliter ferrugineo strigatum; macula infra oculos et aures nigricans; collum anticum ferrugineo albidum; nucha, collum posterius, pectus abdominisque brunneo fusca, ferrugineo longitudinaliter large striata; tectrices dorsi alarumque fusco brunneae, apice ferrugineo terminatae; remiges longi, hirundinacei, brunneo nigricantes, in medio ferruginei, brunneo subfasciati variegataque, apice ferrugineo nigroque fasciati ac maculati; cauda longa, alis vix longior, fulvo-ferrugineo 6 subfasciata, apice nigricans, fulvo obscure fasciolata, fulvo marginata, subtus pallidior; crissum albidum; cera et genae nudae, flavicantes, pilosae; rostrum gallinaceum, breve, subcompressum, apice subaduncum, albicans; pedes cinereo-flavicantes; unguis niger; oculi brunnei. Longitudo corporis 1° 5', caudae 6 $\frac{3}{4}$ ', part. caud. alas exsuper. $\frac{1}{2}$ '



GYMNOOPS fasciatus.

Gymnops à sept bandes

Tab. IV.



GYRINOPS strigilatus.

Le petit Caracara.

Tab. IV^e

Habitat in sylvis ripariis fluminis Xingú. (An „Cracra piqueno“?). Variat femoribus brunneo maculatis caudaque magis brumescente; mas differt a foemina corpore minori, capite minus nigro et magis ferrugineo striato, lateribus colli, gula colloque antico magis rufescentibus, pectore magis rufescente, in foemina nigricante. Spec. 5.

SPECIES 5. **GYMNOPTS ATERRIMUS.** Temmink pl. 57.

Violaceo niger; cauda nigra, ad basin alba; maxilla inferior apice minus alta; regio pone oculos late nudiuscula; tarsi breviores, graciliores, aurantii, late squamosi.

Habitat ad ripas fluminis Amazonum, G. strigilato subminor. Spec. 2.

SPECIES 4. **GYMNOPTS AQUILINUS.** Linn. F. formosus. Lath. Buff. 417.

Violaceo niger; collo subtus nudo raro piloso, sanguineo; abdomine, crasso femoreque albissimis; cauda longa, nigerrima.

DESCRIP^TIO. Corpus reliquis speciebus maius, supra et subtus violaceo nigrum, plumis ad radicem albis; caput nigrum, pone, infra et ante oculos nudum, aurantio-rubrum; oculi et pedes rubri; cera cinerascens; nares triquetrae; macula postauricularis grisea; rostrum longiusculum, apice oblique aduncum, alboslavicans; collum anterius nudiusculum, sanguineum; remiges elongati, hirundinacei, supra violaceo nigri, subtus nigri; abdomen, crissum et femora alba; cauda longa, alis sublongior, violaceo relucente nigra; unguis nigri. Longitudo corporis 1° 7', caud. 9½', partis caud. alas super. 1'.

Habitat gregarius in provincia Piauhy sub nomine „Gakaô“ sive „Alma do Cabocolo“ in locis palmiferis, gryllos comedens et voce clara atque garrula clamitans; mas a foemina non differt. Spec. 4.

GENUS VIII. MILVAGO.

Habitu Milvi; rostro Gymnopo simillimo, breviore, acuto, minus adunco et circa oculos multo minus nudo; alis longioribus, caudam breviorem aequantibus; naribus rotundis; gula non nuda,

SPECIES 1. MILVAGO OCHROCEPHALUS. TAB. V.

Ochraceus; stria supra aures nigra; alis caudaque anteriore nigricantibus.

DESCRIP^TIO. Corpus coracium; capit, collum, pectus, abdomen, uropygium, crissum et femora livide ochracea; stria post oculos supra aures nigra; fasciculus auricularis pallide ochracens, intunescent; dorsum nigricans; alae supra nigricantes, subtus ochraceae; tectrices alarum posteriores fusco-albo terminatae; remiges cruciati, nigri, medio albentes brunneoque subfasciati, apice nigri, albido terminati, secundarii vexillo interiore medio fulvo nigroque fasciati, apice albido terminati; cauda mediocris, aequalis, alas non exsuperans, medio et versus basin ochracea, nigra, undulata 6 fasciolata, anterior nigricans, apice albido terminata; rostrum gallinaceum, minus altum minusque aduncum, subdentatum, plumbeum, apice albicans; cera minor, ante, nec non pone oculos nuda, flavicans; nares rotundae, fronti plumosae proximae; tarsi breviusculi, coerulescentes, subgraciles; ungues nigri, compressi, acuti. Longitudo corporis 1° 1', caudae 6', tarsi 2'

Habitat in Capitania St. Pauli supra arbores campestres, insectis et passeribus vicitans. Sp. 1.

GENUS IX. BUTEO.

Falconeus, Milvaginem inter et Falcons intermedius; tarsis validis, brevibus, semiplumosis; alis longis, hirundinaceis; cauda aequali.

SPECIES 1. FALCO PLUMBEUS. Lath. TAB. VIII.

Plumbeo niger; capite, collo corporeque subtus immaculate plumbeis; alis nigris, medio castaneis, longissimis; cauda nigra, albo maculata.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine Mouedulae, subtus immaculate plumbeum; caput plumbescens, supra oculos nigro substriatum, fronte in maribus nonnihil grisea; lora, collum, pectus, abdomen, femora crissumque immaculate plumbea; alae supra vio-



MILVAGO Ochrocephalus

Milan à tête et ventre ocreés.

Tab. V.



FALCO plumbbeus

La Tezoura cendrée.

Tab. VIII⁴

laceo nigrae, subtus antice plumbeae, postice castaneae, scapis flavidis; remiges longi, hirundinacei, in mare cauda longiores, nigri, vexillo interno medio castaneo-ruso, secundarii plumbei, vexillo interno cinerascente; cauda nigerrima, aequalis, alis brevior, rectricibus vexillo albo 3 maculato vel fasciato; rostrum nigrum, apice crassiusculum, subacute dentatum, aduncum; nares subrotundatae, transversae, fronti proximae; cera exigua, cinerea; tarsi breves, aurantio-flavi, semiplumosi, squamosi; ungues nigri. Longitudo corporis 1° 5', caudae 5 $\frac{1}{2}$ ', part. caudae alis longioris 5', tarsi 1 $\frac{3}{4}$ '.

Habitat gregarie sub nomine „Tezoura“ in campis montosis provinciae Rio de Janeiro, Piauhy etc., vel in aere quasi suspensus, vel ex arboribus altis regionem perlustrans. Mas a foemina vix differt, alis modo cauda praelongioribus; differt vero a falcone Temminkii pl. 180 capite colloque non albicantibus, corpore subtus non corvate nigro maculato, tectricibus alarum fulvo non marginatis. Sp. 4.

SPECIES 2. FALCO CAYENNENSIS. TAB. VIII^c foem.

Nigricans supra, subtus albus; rostro apice longiore; capite nuchaque cinerascentibus; cauda plumbeo nigroque sex vittata.

DESCRIP^TIO. Corpus Corvo maius; caput, lora nuchaque cinerea; gula, pectus, abdomen, femora crissumque alba; hypochondria alba, pennis quatuor nigris; alae longiusculae, cruciatae, supra plumbeo nigrae, subtus albo nigroque fasciatae, ad marginem axillarem album nigro striatae; remiges obscure nigro plumbeoque fasciati, apice nigri; cauda longiuscula, aequalis, alis longior, nigra, plumbeo trifasciata, apice albo-marginata; rostrum robustius, nigrum, apice longum, dentatum, aduncum; cera nuda, flava; oculi rubroflavi; nares transversae; pedes breves, nigri, albo pulverulentii; tarsus brevis, crassiusculus, semiplumosus; ungues nigri. Longitudo corporis 1° 7', caudae 10 $\frac{1}{2}$ ', part. alas exsup. 2', tarsi 1 $\frac{1}{2}$ '.

Habitat in campis Bahiae; mas (Buff. pl. 475.) differt a foemina nucha magis albescente, alis brevioribus, fasciis caudae albis, latioribus. Sp. 2.

GENUS X. B I D E N S.

Tinnunculoides, exiguus; pedibus gracilioribus; rostro brevi, subcompresso, plus minusve bidentato; alis cruciatis, cauda brevioribus.

SPECIES 1. BIDENS RUFIVENTER. TAB. VI.

Plumbeo niger supra, subtus castaneus.

DESCRIP^TIO. Corpus Tinnunculo parum maius, supra et ad gulam plumbeo nigricans; pectus, abdomen femoraque castaneo rufa; crissum albicans vel fulvescens; alae nigro plumbeae, subtus rufo albicantes; remiges primarii nigricantes, vexillo interiore medio, uti et secundariorum albofasciato; cauda alis dimidio longior, nigra, albo fasciata, fasciis vexilli interioris albidiioribus, subtus albis, plumbeoque nigris, permeantibus; rostrum breve, crassum, apice largiusculum, nigrum, excisum, supra ac infra bidentatum, maxilla inferiore albicante; nares rotundae, intermediae; cera pedesque flavescentes; ungues breves, nigri; digitus posticus longior. Longitudo corporis 1°, caudae $6\frac{3}{4}'$, c. partis alas superant. $2\frac{1}{2}'$.

Habitat ad flumen Amazonum; foemina diversa est a mare gula magis rufa crisoque alborufescente; minus differt a falcone Temminkii pl. 58 gula non alba, ab domine non rufo alboque undulato, colli lateribus non plumbeis, magis vero a falcone Temminkii, Aldrovandino dicto et a. cl. Reinwardto ex Java allato (pl. 128) gula non fulva, criso non castaneo, cauda non multifasciolata, rostro non edentato alisque caudam non aequantibus. Sp. 2.

SPECIES 2. BIDENS ALBIVENTER. TAB. VII.

Brunneo-fuscus supra, plumis apice fulvomarginatis, subtus sordide albicans; pectore subferrugineo, fusco striato.

DESCRIP^TIO. Corpus praecedente minus, supra fusco brunneum, plumis apice fulvo marginatis; caput nigricans, loris rufofuscis; gula, collum anticum pectusque sordide albo-ruso nigroque striata; abdomen, crissum et femora sordide alba; alae cauda minores, subtus albicantes; remiges primarii fusco brunnei, vexillo interiore albo nigroque fasciato, subtus quasi albicante, secundarii albo maculati; cauda nigri-



BIDENS Rufiventer

Bident à ventre rouge.

Tab. VI.



BIDENS Albiventer.

Bidens à ventre blanc

Tab. VII.



BIDENS femoralis

Bidens à jambes rouges

Tab. VIII

cans, albo 4 fasciata, albo terminata; rostrum apice nigricans, minus altum quam in Rufiventre, breve, supra et subtus bidentatum, pone flavicans; nares subrotundae, subalte positae; cera pedesque flavicantes; unguis breves, nigri; digitus posticus brevior. Longitudo corporis 11', caudae 6', c. part. al. super. 2'.

Habitat ad flumen Amazonum. Temminkius pl. 228 Albiventrem Rufiventris juvenem judicat. Sp. 1.

SPECIES 3. **BIDENS CINERASCENS.** (femoralis). TAB. VIII.

Rufiventri affinis, plumbeo niger supra, subtus plumbeus; rostro obsolete bidentato; gula et crasso albicanibus; femoribus castaneis; cauda nigra cinereo obscure fasciata.

D E S C R I P T I O. Corpus Rufiventre vix minus, supra plumbeo nigrum, subtus plumbeum; lora cinereo nigricantia; nucha et dorsum nigro plumbea; alae subtus antice rufescentes, postice plumbeo nigroque fasciatae; tectrices alarum fusco nigrae, inferiores medio albo maculatae; margo alarum externus fulvo rufus; remiges fusco nigri, medio nigro obscure fasciati, vexillo interno albo fasciato, secundarii plumbeo nigricantes, interne fulvo albo fasciati; cauda alis paulo major nigra, obscure cinereo 3 fasciata, ad basin albo maculata, albido terminata, subtus albido nigroque fasciata; rostrum minus compressum, obsolete bidentatum, apice nigricans; nares oblongae; cera pedesque flavi; oculi aurantii; unguis breves, nigri. Longitudo corporis 11', caudae 5 $\frac{1}{2}$ ', c. porc. alas sup. 1 $\frac{3}{4}$ '.

Habitat in provincia Minas Geraes et Rio de Janeiro; Temminkius eandem speciem bis depinxisse videtur; avis in tabula 198 spectanda vix differt a Bideute cinerascente; haec vero differt a falcone Temminkii pl. 205 aequo e Brasilia allato tectricibus alarum non plumbeo marginatis et strigilatis, crasso non cinereo, rostro non edentato, capite haud plumbeo, pedibus multo minus altis, loris non plumbeis. Sp. 1.

SPECIES 4. **BIDENS SPARVERIUS.** Buff. pl. 465.

Nigro rufescens; capite cinereo; abdomine fulvo-albo, rufosuscō strigilato; cauda rufa, nigro 11 undulata; rostro obsolete dentato.

D E S C R I P T I O. Corpus Timunculo parum minus; caput cinerascens, in maribus rufo variegatum; macula auricularis albicans, antice et postice nigrofasciata; collum anticum, nti et gula, albicans, laterale fulvescenti nigroque usque ad nucham fasciatum; gula, femora crissumque fulvo albicantia; uropygium castaneum; pectus et abdomen albicantia, brunneo rufo strigilata; dorsum rufescens; tectrices alarum rufo nigroque undulatae; remiges primarii longi, nigri, vexillo interiore medio fulvo-albo fasciato, secundarii fulvo-albo nigroque maculati, apice albomarginati; cauda alis parum minor, supra rufo-nigro 11 undulata, apice nigro fasciata fulvoque terminata, subtus rufo livescens, nigrofasciolata; cera pedesque breves, flavicantes; unguis acuti, nigri; rostrum cinereo nigricans, subbidentatum, dente anteriore acuto; nares rotundae. Longitudo corporis 9 $\frac{1}{2}$, caudae 4 $\frac{1}{2}$, c. part. al. sup. 1'.

Habitat solitarius in campis Minas Geraes, gryllos comedens; mas foemina parum minor dorso tectricibusque alarum magis rufescentibus. Sp. 3.

SPECIES 5. **BIDENS DOMINICENSIS.** Buff. pl. 444.

Plumbeo rufescens; tectricibus alarum plumbeis, nigro ocellatis; cauda castanea, apice nigro alboque fasciata; pectore et abdomine nigro ocellatis.

D E S C R I P T I O. Corpus magnitudine praecedentis; caput cinerascens, vertice rufescente, loris nigris, macula auriculare albida, pone nigro cincta; gula albescens; collum laterale albido nigroque usque ad nucham fasciatum; pectus abdomenque superiorius nigro ocellata, posterius usque ad crissum fulvo albicans; dorsum castaneum, nigro maculatum; tectrices alarum plumbeae, nigro ocellatae; remiges nigri, apice albo marginati, vexillo interiore nigro fasciato, secundarii plumbei, medio nigri, vexillo interiore albo nigroque fasciato; cauda alis parum longior, castanea, ad apicem nigro fulvo-alboque fasciata, rectricibus exterioribus albicantibus, interne nigro maculatis; cera pedesque flavicantes; rostrum obsolete bidendatum.

Habitat in campis Minas Geraes. Lathamius Dominicensem Sparverii variatem false admittit. Sp. 1.



FALCO insectivorus.

Pauvres à bandes ondulées

Tab. VIII^e

SPECIES 6. BIDENS AURANTIUS. Lath.

Nigricans; collo antico albido; femoribus crisoque castaneis; pectore, abdomine anteriore caudaque nigris, albo fasciolatis.

DESCRIP^TIO. Corpus Tinnunculo minus; caput, lora, collum laterale et nucha nigra; gula albicans; collum antice albicans, infra rufo cinctum; dorsum plumbeo-nigrum; alae longae, hirundinaceae, subtus nigrae, albo lineatae; tectrices alarum supra anteriores nigrae, posteriores nigrae, plumbeo fimbriatae; remiges nigricantes, vexillo interiore medio albo lineato; cauda brevis, alis aequalis, nigra; rectrices apice tricuspides, vexillis interioribus albo 5 lineatis, externa subtus extorsum albopunctata; pectus et abdomen posterius, femora crissimque castanea; cera cinerascens; rostrum nigrum, infra subbidentatum; oculi magni, brunnei; pedes flavicantes; unguis nigri. Longitudo corporis 8', caudae 4'.

Habitat ad flumen Negro. Sp. 1.

GENUS XI. FALCO.

Rostro breviusculo, vix dentato, adunco.

SPECIES 1. FALCO INSECTIVORUS. TAB. VIII^a.

Cinerascenti-fuscus; capite cinerascente; pectorc cinerascente, non strigilato sed large maculato; abdome albicante, rufo fasciolato; criso albido.

DESCRIP^TIO. Corpus Corvo minus, supra cinerascens vel cinereo fuscu; lora cinerea; gula grisea; pectus cinerascens, ferrugineo large maculatum; abdomen albicans vel fulvescenti-album, ferrugineo undulate fasciolatum, plinis albo ferrugineo-que fasciolatis; femora fulvescentia, fasciolis ferrugineis, tenerrimis; crissum album, haud raro fusco fasciolatum; uropygium fulvum, brunneo maculatum; dorsum et tectrices alarum fusco cinerascentia, apice immaculata; alae longiusculae, cauda breviore, subtus albescentes, ferrugineo punctulatae vel maculatae, pone nigro fasciatae; remiges nigrofusci, nigro fasciolati rufoque late fasciati, secundarii cinerascentes, nigro fasciolati, vexillo interiore albido, apice albo fimbriati; cauda aequalis, nigro cinereoque late 3 fasciata, ad radicem albicans, apice cinerascens, subtus albo nigroque fasciata; rostrum sublongum, in frontem plane decurrens, apice edentatum, peraduncum; oculi,

cera et pedes flavi; nares rotundae; pedes graciles; unguis nigri. Longitudo corporis 1°, 1', caudae 6', c. alis longior. 2'

Habitat in sylvis provinciae Rio de Janeiro et Paraë, scarabacis gryllisque vicitans, mas a foemina vix diversus. Sp. 1.

SPECIES 2. FALCO MAGNIROSTRIS. Buff. pl. 46. t. Tcm. pl. 86.

Fusco brunnescens; capite fusco, rufostriato; collo antico albicante, fusconigro longitudinaliter striato, laterali rufescente; pectoris et abdominis maculis brunneo-rufis, cordiformibus, fasciolatis; tectricibus alarum dorsique brunneo nigris, rufo terminatis.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine praecedentis; caput crassum, fusco brunneum, rufo strigilatum; lora fulva, plumulis apice fuscis; gula albicans; collum anticum et pectus superius albescens vel fulvescentia, fusco longitudinaliter striata; pectus inferius et abdomen maculis cordatis subsacciata; uropygium et crissum ochraceo albescens, cordate maculata; femora fulva, rufo tenerrime fasciolata; alae breviusculae; tectrices alarum et dorsi fuscae, fulvo marginatae; cauda remigesque longiusculi, uti in specie praecedente aliis longiores; rostrum albicans, minus aduncum, inter frontem planiusculum; oculi, cera pedesque flavi. Mas alis medio magis ferrugineis colloque magis fulvescente. Longitudo corporis 1°, 1', caudae 6 $\frac{1}{3}$ ', c. alas exsuper. 3 $\frac{1}{3}$ '.

Habitat in provincia Piauhy, Bahiae etc., s. insectivoro parum, et vix dissimilis falconibus Temminckii pl. 95. 125., excepto, quod cauda non fasciata sed frequenter fasciolata, atque e nova Hollandia uterque allatus sit. Sp. 2.

SPECIES 3. FALCO FEMORALIS. Temminck. pl. 121.

Nigro-fuscus; stria supraorbitali nuchalique et gula rufo-fulvis; macula auriculari rufosulva, antice et postice stria nigra cincta; pectore rufescente, nigro striato; abdomine superiore nigro, posteriore crisoque fulvis; femoribus rufescentibus; cauda longa, nigra; albo 8 fasciolata.

DESCRIP^TIO. Corpus s. aurantio duplo mains, supra nigro fuscescens, subtus nigrum, fulvo mixtum; caput nigricans, supra oculos usque ad nucham fulvo striatum, fronte aequa nigra; gula, collum anticum et laterale, abdomen inferius crissumque rufo-fulva; pectus fulvum, nigro striatum vel potius maculatum; abdomen nigrum; hypochondria nigra, albopunctata; dorsum et alae nigro-fusca; alae subtus ad marginem

humeralis fulvae, antice nigrae, fulvo maculatae, postice albo nigricantique fasciatae; remiges longi, cruciali, nigricantes, vexillo interiore medio albo-fasciato, secundarii fuscii, apice albo-fimbriati; cauda longa, alis longior, nigra, albo 8 fasciolata, apice fulvido terminata; rostrum flavicans, apice cinerascens, dentatum, maxilla inferiore apice bidentata; cera nigro-pilosa pedesque albescenti flavi. Longitudo corporis 1°, caudae 6', c. alas exsuper. 3'.

Habitat ad flumen Amazonum a f. aurantio omnino diversus. Sp. 1.

SPECIES 4. **FALCO XANTHOTHORAX.** Tem. pl. 92. Ruficollis Vieillot.

Rufescens brunneus; abdomine albo, nigro tenerime fasciolato; capite lorisque cinerascenibus; collo cinnamomeo; remigibus caudaque fuscis.

D E S C R I P T I O. Corpus Tinnunculo sere maius; caput et macula auricularis cinerascentia; gula grisea; collum totum cinnamomeum; pectus superius cinnamomeum, obscure nigro alboque fasciatum, inferius, abdomen, crissum et femora alba, nigro tenerime fasciolata; dorsum, uropygium tectricesque alarum fusco-cinnamomea; alae breviusculae, subtus antice albo nigroque fasciolatae, postice albo fuscoque fasciatae; remiges omnes subolivaceo-fusci, vexillo interiore albo fasciato; cauda longiuscula, subviolaceo-fusca, apice inaequalis, albo marginata, vexillo rectricum interiore albo 6 fasciato; rostrum breviusculum, nigricans, edentatum; oculi, cera nuda pedesque flavi; unguis nigricantes. Mas. Longitudo corporis 1°, caudae 6', c. alis longioris 3'

Habitat in provincia Rio de Janeiro muribus vicitans; differt a falcone Temminckii pl. 92. capite lorisque non rufis, remigibus non rufescensibus. Sp. 1.

SPECIES 5. **FALCO NITIDUS.** Lath., Temminck. pl. 91.

Plumbeo-cinereus, albo fasciolatus; tarsis elevatis; digito extimo brevissimo; remigibus nigris; cauda longa, fulvo nigroque bivittata.

D E S C R I P T I O. Corpus Phasiano picto parum minus, subtus nigro alboque fasciatum; caput, nucha dorsumque plumbeo cinerea, immaculata; uropygium fulvum; alae subtus antice nigro alboque fasciolatae, ad marginem humeralis albo variegatae; tectrices alarum cinereae, albosaciolatae; remiges longiusculi, cauda breviore,

vexillo interno medio albo cinereoque punctulato, secundarii plumbei, apice griseo-marginati, vexillo interno medio nigro alboque fasciato; cauda longa, fulvo-nigro 3 vittata, apice fulvo-marginata; rostrum longiusculum; cera cinerea; nares ovatae; pedes graciles, alti, flavi; digitus externus breviusculus; unguis nigri. Longitudo corporis 1° 4', caudae 9', caud. alis long. 3½', tarsi 3⅓'.

Habitat in insula Marajo, falconi Temminckii pl. 87, 122 similis et vix diversus ab illo Temminckii pl. 91 nisi rectricibus alarum non immaculatis, margine humerali non nigro, crasso non nigro-fasciato caudaque non isabellino-, sed fulvo vittata, ab illo pl. 3 nisi corpore subtus plumbeo non fasciolato. Sp. 1.

S t r i g e s.

Rapaces, carnivorae, nocturnae; plumis mollibus, intumescentibus; rostro brevi, edentato, adunco, vibrissis tecto, vix conspicuo; oculis grandibus, antrorum versis, plumis circulariter circum positis; digito externo versatili.

G E N U S I. S T R I X.

A. A U R I C U L A T A.

S P E C I E S I. STRIX LONGIROSTRIS. T A b. IX^a

Mediocris, rufescens, supra et subtus absque albo, rufescens, nigro-brunneo longitudinaliter striata; capite subfalconeo, ad gulam et infra oculos ferrugineo; rostro elongato; pedibus elevatis; circulo orbitali retroverso, nigro et pone ferrugineo-terminato; alis caudaque brevioribus.

D E S C R I P T I O. Corpus Strigi Oto fere majus, accipitrinum, versus nares et supra oculos setis albis tectum, rostro nigro, elongato, conspicuo, oculis magis lateralibus, operculo auriculari pectinato collarique orbitali plumosis retroversis, fronte fere plana, non grisea sed rufa, nigro-striata; collare orbitale infra oculos rufum, dein album, nigro rufoque usque ad cristam cinctum; mentum album; gula rufo-nigro strigilata; crista auricularis utrinque 8 pectinata; vexillum pennarum longitudinalium internum rufum, externum nigrum; tectrices colli, nuchae, corporisque subtus immaculate rufae, vexillo medio longitudinaliter nigricanti-strigilato; femora crissumque fulva, nigro substriata;



STRIX longirostris

Tab. IX^a

tectrices alarum dorsique rufae, medio brunneo-nigro strigilatae ac fasciolatae, versus margines brunneo-punctatae, alae cauda perbreviores, subtus antice ochraceo-albae, brunneo raro strigilatae, postice fulvo-albo nigroque fasciatae; remiges nigrido fulvoque griseo fasciati, vexillo interno versus radicem fulvo albicante, exteriorum barba externa serrata; cauda longiuscula, alis praelongior, fulvo-brunneo fulvoque griseo fasciata, subtus fulvescente nigroque fasciolata; pedes elevati, usque ad finem digitorum fulvo-lanuginosi; ungues crassiusculi, longi, adunci, nigri; oculi flavi. Longitudo corporis $1^{\circ} 1\frac{1}{3}'$, caudae $5\frac{1}{2}'$, caud. al. exsuper. $2'$, rostri $1\frac{1}{2}'$.

Habitat in campis interioris Bahiae supra domicilia habitantium noctu ululans; foemina mare major, cauda vix fasciata sed brunneo maculata et variegata, coloribus corporis vivacioribus maculaque pectorali alba; differt a strige Oto europaeo rostro longo, pedibus altis, alis cauda brevioribus, medio minus rufis, corporeque supra et subtus non albo-variegato. Spec. 2.

B. IN AURICULATA.

SPECIES 2. STRIX FLAMMEA.

Mediocris, cinereo-rufescens, supra rufo-cinerascens, subtus fulvo-albescens, nigro punctulata; rostro albo, longiore, circa oculos parum rufo-fusco plumoso; operculo cartilagineo auriculari minus brevi; collari orbiculari albo rufoque usque ad frontem circumcincto; tarsis lanuginosis; alis cauda longioribus, griseis.

D E S C R I P T I O. Corpus Strigi flammeae europaeae simillimum non differt ab hac nisi colore rufo cinereoque dorsi fusci alarumque vivacioribus, rostro longiore, tarsis altioribus, oculis nigris.

SPECIES 3. STRIX GRALLARIA. Temminck pl. 146.

Minor, fusco-brunnea ocellisque fulvo variegata supra, subtus fulvescens, brunneo-maculata; tarsis elongatis, sublanuginosis; operculo auriculari nullo; circulo orbiculari brunneo alboque, vix conspicuo, depresso; macula pectorali alba; cauda alis vix longiore.

D E S C R I P T I O. Corpus Strige passerina europaea vix maius, supra fusco-brunneum, maculis rufescens striatum, supra oculos fulvescens, infra rufescens, supra aures rufo-griseum, parum albido cinctum; operculum cartilagineum auriculare

nullum; macula auricularis griseo-rufescens, circulo faciali brevi, depresso, albo, nigro-marginato; gula albescens; collum fulvo nigroque subspectiatum; macula pectoralis albescens; pectus abdomenque superius albo-fulvescentia, fulvo-brunneae maculata vel variegata, posterius, femora crissumque fulva; dorsum tectricesque alarum fusco-brunnea, plumis lateralibus albo-ruso ocellatis; alae caudae fere aequales, subtus ruso-fulvae alboque rufae, varie nigro-striatae, postice nigro fulvoque transversim maculatae; remiges fusco-brunneae, lateraliter transverse fulvo-albo maculatae, apice fuscae, secundariae apice albosulvae; cauda fusco-brunnea, apice albicans, vexillo rectricum interno transverse fulvo-maculato, externo fulvo-subocellato, subtus pallide nigro-fulvoque fasciolatae; rostrum albicans, setis nigris obtectum; tarsi subelevati, sublanuginosi; digitii nigri, subpilosii; unguis niger. Longitudo corporis 8 $\frac{1}{2}$, caudae 5', tarsi 1 $\frac{3}{4}$.

Habitat diu in campis provinciarum Minas Geraes et Parae. Mas a foemina non distinctus. Spec. 4.

SPECIES 4. STRIX CRUCIGERA. TAB. IX.

Minor, griseo brunnescens supra, subtus sordide albicans, striis longitudinalibus, decussatis, fusco-brunneis; collaris auriculari depresso, vix conspicuo; femoribus rufis; tarsis brevibus, sublanuginosis; plumis dorsi lateralis longitudinaliter albo substratiis.

DESCRIP^TIO. Corpus praecedente parum minus, plumis supra, praecipue subtus fusco-brunneae longitudinaliter striatis lineolisque decussatis, ad radicem nigro cinereis; caput tectricesque alarum dorsique fusco brunnescientia, plumis fulvo fuscoque brunneae decussatis; macula auricularis ad radicem fulvescens, apice nigricans; collum, praecipue pectus abdomenque albantia plumis medio fusco-brunneae longitudinaliter striatis, lineolis transversis decussatis; crissum rufescens, vix fusco lineolatum; femora rufa; plumae dorsi laterales in vexillo externo albantes; alae subtus ad marginem axillarem medioque fulvae, postice fusco-nigro fulvoque fasciatae; remiges cauda subbreiores, rufo-fulvo, brunneaque nigro fasciati, apice rufescenti grisei, secundarii medio intus fulvescentes, apice brunneo-griseo variegati; cauda aequalis, fusco-brunneae rusoque 8 fasciata, apice griseo variegata; rostrum plumis fulvis setisque nigris subobtectum, apice



SURIX crucigera.

Chouette à flèches.

Tab. IX.



STRIX undulata.

Chouette ondulée.

Tab. X.



STRIX albomarginata

Tab. X 2

fulvo flavicans; oculi brunnei, supra fulvo striati; tarsi breves, sublanuginosi; ungues flavicantes. Longitudo corporis $7\frac{1}{2}'$, caudae $3\frac{1}{2}'$, caud. alis long. $\frac{1}{2}'$, tarsi 1'. Mas.

Habitat in pratis campestribus juxta flumen Amazonum. Sp. 1.

SPECIES 5. STRIX UNDULATA. TAB. X.

Minor, rufescenti grisea; plumis supra fulvo fuscoque brunneo-, subtus albo-fulvo fuscoque brunneo undulatis; tarsis brevibus, semilanuginosis; cauda alis breviore.

DESCRIP^TIO. Corpus strige atricipite Tem., crucigeraque parum minus, plumis omnibus albido-fulvo fuscoque nigro undulatis, ad radicem nigris, subtus sordide albescens, albo-fusco brunneoque fulvo undulatum; caput depresso, rufescenti griseum, plumis albo-fulvo fuscoque brunneo tenerime fasciolatis, supra oculos nigricans; macula auricularis rufo nigroque cincta; collum dorsumque magis fusco-brunnea; tectrices alarum anteriores apice subalbicantes, posteriores brunneo nigricantes, rufo subfasciatae; alae cauda longiores, subtus antice rufescentes, nigro striatae, postice fulvo nigroque fasciatae; remiges longi, nigro-brunnei, fulvorufo fasciati vel maculati, maculis vexilli externi quadratis, medio nigrido punctatis, apice rufo brunneoque grisei; cauda brevis, nigro-brunneo variegata, rufo irregulariter fasciata, apice grisea; rostrum canescens; nares rotundae; tarsi breves, semilanuginosi; digiti medio flavo-albescentes; ungues fusi. Longitudo corporis $6\frac{1}{2}'$, caudae $2\frac{3}{4}'$, tarsi 1'.

Habitat in campis paludosis provinciae Minas Geraes. Sp. 1.

SPECIES 6. STRIX ALBOMARGINATA. TAB. XI.

Majuscula, nigra, brunneo renitens, supra et subtus tenerime albo undulata; tarsis nigro-griseis, lanuginosis; cauda nigra, albo 4 fasciolata, apice albomarginata.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine Corvi, supra et subtus nigrum, fusco-brunneo renitens, plumis omnibus albo 5 fasciolatis, fasciis albis abdominis, femorum crissique latoribus; caput crassum, plumis depressis; rostrum flavum, mentum palpebraeque setis nigris munita; orbitae plumis brevioribus, rigidis, nigro-albo fasciolatis anulariter circum-

cinctae; gula nigra; alae cauda subbreviores, cruciatae, supra nigrae, brunneo relucentes, albo fasciolatae, subtus antice albo nigroque lineatae, medio albantes, postice albo nigroque fasciatae; remiges primarii nigro brunnecentes, medio obscure albo fasciolati, secundarii albo fasciolati, fasciis vexilli interni largioribus; cauda nigra, undulata albo & fasciolata, apice albo marginata; rostrum flavum, subconspicuum; tarsi subelevati, plumosi, nigro alboque fasciati; digiti nudi, flavi; ungues albantes, apice nigricantes. Longitudo corporis $1\frac{1}{2}'$, caudae $6\frac{1}{3}'$, caudae alis long. $1'$, tarsi $2'$.

Habitat noctivaga in sylvis provinciae Rio de Janeiro, a Strige Levai!lantii pl. 41. alis caudaque non brunneis, fasciis abdominis albis non largis, caudaeque non irregularibus, tarsis non immaculatis diversa. Sp. 1.



ARA hyacinthinus.

Le Perroquet à couleur changeante de Saphir.

Tab XXIII.

P s i t t a c i.

Scansores, fructivori, loquaces, gregarii, monogami, facile circumscripti, zonae torridae incolae, in arboribus excavatis nidificantes; rostro robusto, e basi aduncus, pedis instar ad scandendum adjuvante; maxilla inferiore robusta, alta, apice rotundata; rictus oris circulari; lingua carnosa, integra; naribus extra integumentum corneum ad basin rostri juxta frontem positis, subsuperis; collo crasso, subretractili; tarsis abbreviatis, fere totis nudis, reticulatis; digitis scansoriis, 2 anticis, 2 posticis, inaequalibus, liberis, externo antico longiore, postico sublongo, subversatili.

GENUS I. A R A R A.

Macrourus, mordax; genis largissime, orbitis circum nudis, rugosis; rostro robusto, dentato; cauda cuneata, longa; rectricibus intermediis longissimis.

SPECIES I. ARARA HYACINTHINUS. TAB. XXIII.

Majusculus, coeruleo-glaucus, colorem corporis modo coeruleum, modo glaucum varians; rostro non robusto; barba maxillari cinerascente; alis intus caudaque subtus nigridis.

D E S C R I P T I O. Corpus ps. Aodorhyncho duplo minus, coeruleo glaucoque relucens; caput, collum et corpus subtus dilute glauca; cera, genae, regio infra poneque oculos nudae, minus extensa, flavae; barba maculaque auricularis cinerascentes; alae hirundinaceae, saturate coeruleo-glaueae, subtus nigridae, ad marginem axillarem aequae glaucae; cauda supra coeruleo-glauea, subtus nigrida, rectricibus mediis subelongatis; rostrum non robustum, dentatum, nigrum, supra medio apiceque albicans; pedes unguesque nigri; oculi albicantes. Mas. Longitudo corporis 1° 4 $\frac{1}{2}$ ', caudae 10', caud. alis longioris 5', tarsi $\frac{1}{2}$ '.

Habitat gregarius, rarissimus licet, prope Joazeiro in campis ripariis fluminis St. Francisci, voce tenui insignis, ab Azara pag. 55 „Guacamayo bleu“ nominatus, et a Sonnini, nec non a Lathamio cum Aodorhyncho Maximiliani Augusti falso commutatus. Sp. 1.

SPECIES 2. ARARA PURPUREO-DORSALIS. T. XXIV.

Majusculus, flavidо-viridis; dorso abdомineque mediis et fronte purpureis; vertice, remigibus primariis caudaeque apicē coeruleis; cauda basali sanguinca.

DESCRIP^TIO. Corpus praecedente minus, supra et subtus flavescenti viride; caput nec non collum coerulecentia, fronte purpurea, lateraliter nigricante, vertice coerulecente, collo dilutiore coerulecente; genae $\frac{1}{2}'$ largiusculae, circa oculos nudae, vibrissis nigris; pectus, abdomen anterius et posterius, femora, crissum, uropygium, dorsum anterius et posterius tectricesque alarum scapulares flavidо-viridia; abdomen dorsumque media purpurea; alae subtus viridi-flavo livescentes, ad marginem humerali et axillareni virescentes; tectrices axillares coerulecentes vel coeruleae; remiges coeruleae, ad marginem internum nigricantes, secundariae inferiores coeruleae, vel virescentes, superiores flavo-virides vexillo interno fuscescente; cauda elongata, cuneata, subtus fusco flavicans, supra posterior sanguinea, anterior coerulescens, rectricibus mediis longioribus; rostrum nigrum, mandibula inferiore profunde emarginata; cera flavicans; oculi aurantii; pedes flavo-albi. Longitudo corporis 1° 1', caudae $6\frac{1}{2}'$, c. alis longioris $2\frac{1}{3}'$

Habitat gregarius sub nomine „Maracana“ in campis Bahiae, foemina mare minor, collo laterali minus coerulecenti; differt a ps. Illigeri et Kuhlii pag. 19. dorso purpureo, Azarae (Maracana fardé) pag. 55 genis non 1" nudis, a ps. militari Lath. et Kuhl. corpore non grandi, uropygio non coeruleo, vertice non viridi etc. Spec. 3.

SPECIES 3. ARARA MACROGNATHOS. TAB. XXV. M. 1 F. 2.

Viridis; maxilla, praeципue inferiore crassissima; fronte coerulea, non coccinea; axillis coccineis; alis caudaeque supra viridibus, subtus flavescentibus; cauda subtus non sanguinca.

DESCRIP^TIO. Corpus praecedente vix minus, supra et subtus saturate viride; caput collumque viridia, non coerulecentia; frons coerulea; genae largae, $\frac{1}{4}'$ nudae; dorsum, abdomen, crissum uropygiumque viridia; alae supra virides, subtus flavo livescentes; humeri supra axillaeque subtus coccinei, medio marginie subflavido; vexillum remigum internum subfuscescens; cauda supra viridis, subtus flavo livescens,



AIRARA purpureo-dorsalis

Perroquet à dos pourpre.

Tab. XXIV



ARARA Macrognathos 1 Mas. 2 Fem.
Arara à grosse mâchoire

Tab. XXV

sanguineo non maculata; maxilla superior alba, inferior crassa, brevis, nigra, apice albicans; cera flavicans; oculi castanei; pedes nigri. Longitudo corporis $1^{\circ} \frac{1}{2}'$, caudae $\frac{1}{2}'$ c. alis long. $5\frac{1}{2}'$

Habitat ad urbiculam Caxocira prope Bahiam et Maranhão; foemina differt a mare humeris subtus, sed non supra purpureis, a ps. nobili et Guianensi Lath. fronte coerulea, alis subtus non flavis, cauda subtus non sanguinea. Sp. 5.

SPECIES 4. ARARA MACAO. Vaill. pl. 1.

Maximus, supra et subtus, infra alas caudamque coccineo-ruber; tectricibus alarum maioribus viridibus; genis periophthalmisque large nudis, plumuloso-rugosis.

DESCRIP^TIO. Corpus totum subtus, caput, collum, dorsum anterius, tectrices alarum humerales, alae et cauda coccineo-rubra; dorsum inferius crissumque coerulea; tectrices alarum maiores immaculate virides, postremae anteriores coeruleae, posteriores virides, apice coerulescentes; remiges omnes coeruleae, vexillo interno fusco-nigro marginato, subtus rubrae; cauda longissima, coerulea, tectricibus intermediis longioribus, rubris, apice coeruleis, lateralium vexillo externo rubro, interno coeruleo, exterioribus coeruleis, vexillo interno rubrofusco; genae large nudae, albicans, lineolis rubro-plumulosis rugosae; rostrum validum, superius albicans, postice lateraliter nigrum, inferius nigrum, apice albicans; pedes nigri; oculi albi. Longitudo corporis $2^{\circ} 4\frac{1}{2}'$, caudae $1^{\circ} 5\frac{1}{2}'$, c. alis long. $9\frac{1}{2}'$.

Habitat familiaris in locis palmiferis Goyatazes, Maranhão et Para; mas a foemina vix diversus. Sp. 5.

SPECIES 5. ARARA ARACANGA. Vaill. pl. 2.

Maximus, supra et subtus miniaceus; tectrices alarum maiores aureo-flavae; alae subtus rubro-livescentes; rectrices intermediae totae miniaceae, laterales coeruleae, versus basim rubro marginatae; rugae genarum piloso-albae; caput flavidо-miniaceum; plumulae nuchae tectorumque alarum apice viridum flavo marginatae; oculi albi; corpus reliquum praecedenti simile.

Habitat in sylvis ad flumen Solimöens, foemina a mare tectricibus alarum maioribus minus flavidis diversa. Sp. 5.

SPECIES 6. ARARA ARARAUNA. Vaill. pl. 3.

Maximus, supra coeruleus, subtus luteus, rugis genarum nigro-plumulosis; rostrum nigrum; frons coeruleo-virescens; gula nigricans; crissum coeruleum; oculi albi. Mas a foemina vix diversus, ps. praecedente vix minor.

Habitat in locis palmiferis interioris Bahiae, Goyatazes et Parac.

SPECIES 7. ARARA SEVERUS. Vaill. pl. 8.

Majuscus, viridis supra et subtus; margo humeralis et ulnaris purpureus; alae coeruleae caudaque medio sanguineae, apice coeruleae, subtus purpurascentes; frons malaeque brunneo fasciatae; femora viridia, rubro parum mixta; crissum uropygiumque viridia; caput coerulecenti viride; genae periophthalmiaque late nuda, brunneo piloso-rugosa; rostrum pedesque nigri; oculi flavo-rubri. Longitudo corporis 1° 5', caudae 9', c. alis long. 4 $\frac{1}{2}$ '.

Habitat in sylvis flum. Amazonum, mas a foemina vix diversus. Sp. 2.

SPECIES 8. ARARA MAKAWUANA. Lath., Kuhl, Vaill. pl. 7, 9.

Majuscus, viridi coerulescens; cauda supra virescens, subtus flavicans; margo alarum externus non ruber; abdomen infimum sanguineo maculatum; alae caputque coerulecentia; alae subtus flavidae; tectrices alarum virides, fusco maculatae; remiges coeruleae vexillo interno flavo-fusco marginato, secundariae coeruleo virescentes; dorsum uropygiumque virides; femora crissumque viridi coerulecentia; genae periophthalmiaque late nuda, flava, verrucoso-pilosa; rostrum dentatum pedesque nigerrimi. Longitudo corporis 1° 5 $\frac{1}{2}$ ', caudae 8 $\frac{1}{2}$ ', c. alis long. 5 $\frac{3}{4}$ '.

Habitat in locis paludosis palmiferis Goyatazes, foemina mare maior, tectribus alarum magis viridibus fuscoque maculatis. Sp. 2.



ARATINGA CAROLINAE.

Perroquet de S.M. la Reine de Bavière.

Tab XII.



ARATINGA haemorrhoa
Perroquet à queue rouge

Tab. XIII.

GENUS II. ARATINGA.

Macrurus, minor. mordax; orbitis nudiusculis; genis angustis, vix vel raro nudis; rostro dentato, graciliore; cauda longiuscula, cuneata; rectricibus intermediis longioribus.

SPECIES 1. ARATINGA CAROLINAE AUGUSTAE. TAB. XII.

Majusculus, aureo-luteus; remigibus viridibus; cauda tota aureo-lutea; rostro flavo-albido.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine Coraciae, supra et subtus immaculate aureo-lutenum, plumis ad radicem albis; genae subplumosae; orbitae circum nudiusculae, flavicantes; tectrices alarum marginisque axillaris luteae; alae supra subtusque aureo-luteae, remigibus viridibus, ad barbam internam nigricantibus; cauda longiuscula, cuneata, supra et subtus aureo-lutea, scapis albidis; rostrum flavidum albicans, crassiusculum, apice acute aduncum, praecipue inferius largum; oculi rubri; pedes albicans; unguis albicans, apice nigri. Longitudo corporis 1°, caudae 6½, c. alis long. 2¾.

Habitat gregarius in sylvis confinibus urbis Parae; mas a foemina tectricibus scapularibus dorsalibusque luteis medio virescentibus, scapisque plumarum abdominis brunnescentibus diversus differt a luteo sive Guarouba Lath., Kuhl., Levaill. pl. 20 et Buff. pl. 525 corpore maiore, rostro multo crassiore, cauda non viridi-coerulea, tectricibus alarum maris non flavo et viridi mixtis. Dubia erroresque autorum de psittaco Iuteo, Guarouba, Ludoviciano et Carolinensi dissoluturis, speciem hanc nullibi dipictam a luteo separavi nomenque Carolinæ Reginae Augustæ Bavariae, fautrici artium scientiarumque imposui. Sp. 5.

SPECIES 2. ARATINGA HAEMORRHOUS. TAB. XIII.

Majusculus, viridis; cauda subtus sanguinea, apice flavo-livescente; vexillo rectricum interno sanguineo, externo viridi; fronte coerulecente; axillis non coccineis; remigibus non coeruleis.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine praecedentis, supra et subtus viride, immaculatum; frons coerulescens; genae viridi-plumosae; orbitae circum nudiusculae; alae subtus antice virescentes, postice flavo livescentes; remiges virides, apice nigricantes, vexillo interno livescenti-fusco, scapis nigris, remige externa subcoerulecente;

cauda supra viridis, subtus sanguinea, versus apicem flavo-livescens; rectrices duae mediae immaculate virides, vexillo reliquarum interno medio sanguineo; rostrum albescens; oculi sulphurei; pedes unguisque albescentes. Longitudo corporis 1°, $\frac{1}{2}'$; caudae $6\frac{3}{4}'$, c. alis long. 5'.

Habitat in Campo Alegre Bahiae, mas a foemina vix diversus. Sp. 5.

SPECIES 3. ARATINGA CHRYSOCEPHALUS. TAB. XIV.

Minor, supra viridis, subtus coccineus; capite colloque aurantiis; fronte, orbitis circum, dorso humerisque subtus purpureis; remigibus, apiceque rectricum violaceis; rostro pedibusque nigris.

DESCRIP^TIO. Corpus Aratinga Carolinæ Augustae fere duplo minus; caput collumque aurantia; frons, regio circa oculos et versus pectus purpurascens; pectus purpureo-aurantium; abdomen anterius virescenti-, posterius purpureum; femora purpureo-virescentia; crissum coeruleo-viride; dorsum viride, medio macula purpurascente; rectrices alarum humeralis superficialesque omnes virides, subjacentes axillaresque coeruleentes; alae subtus nigrae, versus scapulam purpureae, versus marginem humeralem et axillarem virides; remiges violaceae, medio coeruleenti-virides, apice vexilloque interno nigrantibus; cauda flavo-livida, apice violacea rectricibus externis virescenti-violaceis, subtus nigra; rostrum, oculi pedesque nigri. Longitudo corporis 1°, $\frac{1}{2}'$ caudae 6', c. alis longior. 5'

Habitat gregarius vociferansque in campis Piauhy, mas a foemina vix diversus; differt a ps. solstitiali Lath., Kuhl., Vaill. pl. 18, 19 tectricibus alarum uropygique non flavis, a ps. Carolinensi Lath., Kuhl., rostro pedibusque non rubris, ab domine tectricibusque alarum inferioribus non viridibus, a ps. Ludoviciano Kuhl., Vaill. pl. 53, Buff. pl. 199 capite antico toto non rubro, ab domine non viridi, humeris axillisque non flavis.

SPECIES 4. ARATINGA LUTEUS SIVE GUARROUBA. TAB. XIV^a

Miniaeo-aurantius supra et subtus; alis cadaque viridibus, apice violaceis; tectricibus humeralibus luteis, pone viridi mixtis, axillaribus violaceis, scapularibus viridibus; rostro nigro.

DESCRIP^TIO. Corpus Aratinga Carolinæ Augustae fere duplo, chrysocephalo vix minus; caput aurantium; frons, genae regioque interfemoralis et circa oculos



ARATINGA Chrysocephalus
Perroquet à capuchon jaune.

Tab. XIV



ARATINGA luteus s. Guarouba.

Tab. XIV^o



ARATINGA acutirostris.

Perroquet tout vert

ARATINGA xanthopterus.

Perroquet à ailes jaunes.

miniaceae; collum, pectus, femora, uropygium, hypochondria, tectrices humerales supra et subtus axillaeque aurantia, miniaceo hinc inde leviter obduta; tectrices humerales postice, praeceps in foemina vel non adultis luteae, viridi mixtae, axillares violaceae, scapulares virides, flavo marginatae; remiges medio virescentes, apice violaceae, hinc inde flavescentes, vexillo interno nigricanti, subtus livido nigricantes; crissum flavidio virescens; cauda ad basin et subtus flavidio-virescens, versus apicem violacea, rectricum lateralium apice subflavante; rostrum haud crassum, nigrum; pedes nigri, pulverulentii; oculi fusco-castanei. Longitudo corporis 10', caudae 5 $\frac{1}{2}$ ', c. alis long. 5'.

Habitat cum aliis speciebus a Lathamio, Buffonio, Kuhlio et Vaillantio false commutatus et a Vaillantio pl. 18, 19, 20 male pictus in campis Rio Branco, fluminis lateralis fluvii Negro; foemina minus miniacea, viridique super alas nec non dorsum variegata. Sp. 5.

SPECIES 5. ARATINGA XANTHOPTERUS. TAB. XV. Fig. 2.

Minor, supra subtusque viridis; tectricibus alarum ulnaribus luteis; remigibus secundariis non albis sed viridibus; capite, collo remigibusque coerulescenti-viridibus; cauda viridi, apice flavo marginata.

DESCRIP^TIO. Corpus ps. Chrysocephalo minus, supra totum viride excepta macula alarum media lutea, subtus flavescenti virescens; caput collumque canescenti viridia; tectrices alarum anteriores virides, mediae luteae, et tres subjacentes violaceae, majores virides; remiges omnes coerulescenti-virides, vexillo interno fuscescente; alae subtus antice virescentes, postice malachitaceae; dorsum, uropygium, crissum femoraque viridia; cauda supra viridis, apice flavo marginata, subtus malachitaceo relucens, rectricibus apice acutis, intermediis elongatis, non coeruleis sed viridibus; rostrum pedique albicantes; oculi brunnei. Longitudo corporis 8', caudae 4', c. alis 1. 2 $\frac{1}{2}$ '.

Habitat „Perequito do encontro amarelo“ appellatus ad flumen Amazonum; differt a ps. Sosove Lath. et Buff. pl. 456 uropygio non flavo, cauda non brevi, apice non aequali, a Sosove Kuhl et Vail. pl. 58, 59 cauda non brevi, rectrice intermedia non violacea, macula alarum non rufo-aurantia sed sulphurea, nec in foemina deficiente; an idem cum ps. Azarae N° 283? Sp. 4.

SPECIES 6. ARATINGA ACUTIROSTRIS. TAB. XV. Fig. 1.

Minor, supra malachitaceo-, subtus flavo-viridis; remigibus medio violaceis; rostro porrecto, lateraliter compresso.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine praecedentis, subtus flavo virescens, immaculatum; hypochondria et pars alarum humeralis subtus flavescentia; tectrices alarum anteriores et maiores virides, mediae marginales violaceae; remiges primariae violaceae, extus viridi-, intus fusco marginatae, apice virides, secundariae virides; ala subtus postice malachitacea; cauda acuta, subtus malachitacea, supra coerulecenti virescens, rectribus intermediis tenuibus, coeruleis, exterioribus viridibus; rostrum pedesque albicans; oculi nigro-brunnei. Longitudo corporis 8', caudae $1\frac{1}{2}'$ c. alis 1. $2\frac{1}{2}'$.

Habitat in sylvis Rio de Janeiro; differt a ps. rufirostre Lath. et a Sincialo Vail. pl. 42 cauda non tam elongata; an idem cum ps. viridissimo a Kuhl obiter modo descripto?

SPECIES 7. ARATINGA AURIFRONS. TAB. XVI. M. 1. F. 2.

Minor, viridis; fronte nec non periophthalmiis croccis; hypochondriis, alis subtus, abdomine insimo dorsoque medio sanguinolentis; macula auriculari virescente vel flavidio-virescente; remigibus viridibus, apice medioque violaceis; cauda viridi-livida, apice violacea.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine praecedentis, supra viride; caput antice aureoflavescens, fronte periophthalmiisque croceis; barba maculaque auricularis viridi flavescentes; collum, dorsum, tectrices alarum uropygiumque saturate viridia; dorsum medium foeminae purpurascens; pectus, praecipue maris coeruleo virescens; abdomen hypochondriaque purpurascens; femora viridia, plumis rubro marginatis; crissum coerulecenti-viride; alae-subtus nigricantes, versus humerum medio rubrae, ad marginem virides; tectrices alarum virides; remiges medio virescentes, versus apicem violaceae, fusco-nigro marginatae, secundariae anteriores violaceae, subsequentes virides, introrsum flavescentes; cauda olivaceo-viridis, apice violaceo-, subtus flavicante nigricans; rostrum nigrum; periophthalmia vix nuda; pedes nigri. Longitudo corporis $9\frac{3}{4}'$, caudae $6\frac{1}{4}'$, c. alis long. $5\frac{1}{3}'$.

Habitat in campis Minas Geraes, mas foemina maior, pectore magis coerulecente, fronte magis coccinea, macula auriculari minus flavescente, dorso medio non purpureo. Sp. 2.



ARATINGA Aurifrons.
Perroquet à front doré, Mâle & Femelle

Tab. XVI.



ARATINGA cyanogularis.

Le petit Ara à cou bleu

Tab. XVII



ARATINGA Flaviventer
Perroquet à ventre souffré ♂ Male & Femelle

Tab. XVIII.

SPECIES 8. ARATINGA CYANOGULARIS. TAB. XVII. Mas.

Viridis, minor, variegatus; capite fusco; stria infra oculos coccinea; barba maxillari viridi; macula postauriculari maris ferruginea, foeminae brunneo-rufa; axillis, abdomine dorsoque infimis caudaque subtus flavescente purpureis; collari, pectore remigibusque coerulecentibus.

D E S C R I P T I O. Corpus magnitudine praecedentis, viride varieque maculatum; caput nigrofuscum, in mare ruso strigatum; genae coccineae; vitta maris infra oculos ad aures coccinea, foeminae ruso-brunnea; barba maxillaris viridis, longa; macula postauricularis versus nucham in mare ferruginea, in foemina brunneo-rufa; collare coeruleum, antice largum; pectus, hypochondria, femora, crissum, uropygium, nucha, dorsum anterius tectricesque alarum saturate viridia; abdomen, dorsum inferius, cauda subtus humerique purpurei; alae subtus ad marginem virides, postice flavo-livescentes; remiges primariae coeruleae, apice nigricantes, secundariae virides, apice nigromarginatae; cauda sulphureo, rarius virescenti-olivacea, apice virescens; rostrum dentatum, fuscescens, apice flavesiens; periophthalmia vix nuda; pedes nigri. Longitudo corporis 10'; caudae 5 $\frac{1}{2}$ ', c. alis long. 5'.

Habitat in sylvis Rio de Janeiro, a Principe Neovidano ps. cruentatus nominatus; foemina mare parum maior, macula infra oculos et post aures non coccinea neque ochracea sed castaneo-rufa, abdomine magis purpureo, rostro magis nigricante. Sp. 2.

SPECIES 9. ARATINGA FLAVIVENTER. TAB. XVIII. M. 1. F. 2.

Minor, viridis supra, subtus flavesiens, immaculatus; fronte cinereo-virescente; collo pectoreque cinereo-brunnecentibus; abdomine aurantiaco; macula postauriculari viridi; remigibus viridi-coeruleis; cauda supra viridi, subtus flava.

D E S C R I P T I O. Corpus praecedente parum minus, supra viride, subtus brunneo cinerascens ac flavicans; caput virescens fronte subcinerascente; periophthalmia, praecipue foeminae viridia; macula postauricularis, nec non barba maxillaris foeminae virides; barba maxillaris praecipue maris, collum anticum pectusque cinereo-brunnea, in adultis ruso-brunnea; abdomen aurantiacum; femora viridia; crissum flavo-viride; nucha, dorsum totum, uropygium tectricesque alarum viridia; alae subtus antice subflavicas, viridi marginatae, postice nigrae; remiges primariae virescentes, apice coerulecentes, vexillo interiore fusco marginato, secundariae coerulecentes; cauda

supra viridis, apice coeruleo-scapularis; subtus flavicans; rostrum album; oculi albo-flavi; pedes fuscii; periophthalmia flavo-alba. Longitudo corporis $8\frac{3}{4}'$; caudae $5'$ c. alis long. $2\frac{1}{3}'$.

Habitat in campis prope Contendas ac Joazeiro et in Pyauhy; mas collo pectoreque magis aurantiacis fronteque magis cinerascente. Sp. 8.

SPECIES IO. ARATINGA CAIXANA. TAB. XIX. Fig. 1.

Minor, supra viridis; collo antico cinereo-flavo; abdomine aurantiaco; remigibus secundariis sulphureis.

D E S C R I P T I O. Corpus supra viride; frons coeruleo-scapularis; periophthalmia crissumque subflavida; macula auricularis viridis; collum anterius pectusque cinereo-flavida; abdomen aurantiacum; cauda viridis, subtus flavicans; remiges virescenti coeruleae, secundariae sulphureae; rostrum album; pedes albicantes. Vix differt a specie precedente magnitudine modo, nec non colore secundariarum flavo; an ejusdem varietas? Sp. 1.

SPECIES II. ARATINGA NINUS. TAB. XIX. Fig. 2.

Viridis, minor; genis barbaque maxillari fusco-coccineis; macula auriculari grisea; collaris parvo, coeruleo pectoreque virescuti albo-fimbriatis; macula dorsi infimi abdominalisque, axillis caudaque supra et subtus sanguineis.

D E S C R I P T I O. Corpus minimum, supra viride; caput suscens, plumis squamulosis; genae barbaque maxillaris fusco-coccineae; macula postauricularis grisea; cervix coeruleo-scapularis; gula, collum anterius pectusque coeruleo-viridia, plumis fulvo-albo marginatis; abdomen, femora crissumque viridia; macula abdominalis intermedia dorsique infimi coccineae; axillae subcoccineae; tectrices alarum dorsumque viridia; remiges primariae coeruleentes, apice coccineo-brunneae, secundariae virides; alae subtus flavo-livescentes; cauda supra et subtus sanguinea, rectricibus sublateralibus ad basin extus viridibus; rostrum pedesque nigricantes; oculi brunnei. Foen. Longitudo corporis $6\frac{3}{4}'$, caudae $3\frac{1}{2}'$, c. alis long. $1'$.

Habitat ad flumen Negro, Eletithy ab Indiis dictus. Sp. 1.



ARATINGA Caixana.

ARATINGA Ninus



ARATINGA *perlatus*.

Perrquet à tête et cou perlés. — *Mâle. 2 Femelle.*



ARATINGA *fasciatus*. 1. Mao 2. Fem.

Petit perroquet à bandeaux.

Tab. XXI

SPECIES 12. ARATINGA PERLATUS. TAB. XX. M. 1. F. 2.

Viridis, minor; genis barbisque maxillaribus viridibus; cauda supra sanguinea, subtus nigra; dorso infimo non rubro; axillis alisque ad marginem subtusque coccineis; pectore margaritaceo, variegato; remigibus crisoque coeruleis.

DESCRIP^TIO. Corpus ps. flaviventre minus; caput nuchaque nigro fuscescentia, fronte coerulecenti; genae virides; barba maxillaris viridi-coerulecens; macula auricularis grisea; collum anterius virescenti-fuscum; pectus coerulecens, plumis albido terminatis; dorsum totum, tectrices alarum, uropygium abdomenque viridia; femora coerulecenti-viridia; crissum coeruleum; alae ad axillas, ad marginem externum et subtus antice coccineae, postice nigricantes; remiges primariae coeruleae, duae exteriore nigrae, secundariae virides; cauda supra sanguinea, apice subcoerulecens, subtus nigricans; rostrum albicans. Foemina Fig. 2. (an forte species diversa?) differt a mare corpore dinnidio minore, plumis capititis squamulosis, collo fusco-griseo, abdome rubro maculato, femoribus coerulecentibus, caudaque fusco-sanguinea, apice fulvida. Longitudo corporis 8', caudae 4½', c. al. long. 2½'.

Habitat in sylvis flumini Amazonum adjacentibus. Sp. 2.

SPECIES 13. ARATINGA FASCIATUS. TAB. XXI. M. 1. F. 2.

Minor, supra viridis, subtus variegatus; fronte subcoccinea; collo anteriore pectoreque olivaceis, plumis fulvo-nigroque terminatis; humeris non rubris; cauda viridi, apice subtusque sanguinea; genis nigris; barba maxillari viridi; macula auriculari brunneo-grisea.

DESCRIP^TIO. Corpus Aratinga cyanogulari parum minus, supra viride; caput viride, plumis apice subsquamulosis, fronte nigro coccineoque marginata; genae nigridae; barba viridis; macula auricularis brunneo-grisea; collum anterius pectusque olivacea, plumis flavo nigroque fimbriatis; hypochondria, crissum abdomenque viridia, abdome medio sanguineo; nucha, dorsum, tectrices alarum uropygiumque viridia, dorso medio maris rubro submaculato; alae subtus antice virescentes flavidaeque, postice nigro lvescentes; remiges coerulecentes, margine externo apiceque fuscescentibus, remige exteriore extus coeruleo marginata, secundariae virides, introrsum flavicantes; cauda versus basin virescens, versus apicem et tota subtus sanguinea; rostrum albicans; pedes nigricantes. Foemina mare majuscula pectore minus flavescente, abdome minus, dorso medio non sanguineo. Longitudo corporis 8½', caudae 4½', c. al. long. 2'.

Habitat in campis Minas Geraes sylvisque Rio de Janeiro adjacentibus, a psittaco vittato Kuhl vix diversus. Sp. 2.

SPECIES 14. ARATINGA MELANURUS. TAB. XXII. M. 1. F. 2.

Minor, viridis supra et subtus; collaris coerulecente pectoreque viridi albo-fasciolas; tectricibus alarum radialibus suprajacentibus rubris flavisque; genis barbaque viridibus; cauda supra et subtus nigrida.

DESCRIP^TIO. Corpus praecedente parum minus, totum viride, excepto collari coerulecente, albidoque fasciolato; caput viride, plumis medio fuscis, fronte rubro-fusca; periophthalmia circum nuda; genae, barba maculaque auricularis flavo-virides; collare fusco viridique variegatum, albido fasciolatum; dorsum, tectrices alarum, hypochondria, abdomen, uropygium, crissum femoraque viridia, immaculata; alae virides tectricibus radialibus subjacentibus miniaceis, flavo marginatis, subtus apice virides, postice nigro livescentes; remiges coeruleo-virides, apice nigridae margine externo serrato, remiges exteriores nigrae, secundariae virides, introrsum livescentes; cauda ad basin virescens, reliqua supra et subtus nigra; rostrum apice albicans; pedes nigridi; oculi albidi. Longitudo corporis 8½' caudae 4½', c. alis long. 2½'.

Habitat ad Tabatinga prope flumen Solimöens; mas foemina minor capite squamuoso-plumoso, pectore minus fuscenti, tectricibus alarum subjacentibus miniaceis, maioribus coerulentibus. Sp. 2.

SPECIES 15. ARATINGA NOBILIS SIVE GUIANENSIS. Lath.

Vaill. pl. 15, 16., Buff. pl. 167, 407.

Medius, supra et subtus herbacco-viridis; margine alarum externo coccineo; tectricibus humeralibus subtus viridibus, posterioribus luteis; remigibus supra viridibus, subtus flavo livescibus; cauda supra flavo-viridi, subtus flavicante, ad basin sanguinea; criso flavicante; rostro albo; pedibus fuscis; genis viridi-plumosis. Longitudo corporis 11', caudae 7', c. alis long. 4'.

Habitat in campis Minas Geraes prope Tijuco. Sp. 1.



ARATINGA *melanurus*, *Mav. & Frem.*

Peroquet à queue noire.

Tab. XXII.

SPECIES 16. ARATINGA AUREUS LINN.

Brasiliensis. Lath., Buff. pl. 858. Vaill. pl. 41.

Minor, supra viridis, subtus sulphureo-viridis; pectore cinereo-virescente; fronte et periophthalmiis aureo-flavis; vertice genisque coerulecentibus; remigibus primariis coeruleo virescentibus, secundariis violaceis; tectricibus alarum majoribus viridibus, introrsum flavidis; cauda viridi, apice coerulecente, subtus alisque infra sulphureis; rostro pedibusque nigris. Longitudo corporis 9', caudae 5½', c. al. l. 5'.

Habitat sub nomine „Tiriba“ in Sylvis fl. Amazonum, plantationes zae devastans. Sp. 2.

SPECIES 17. ARATINGA PERTINAX LATH.

Buff. pl. 528. Vaill. pl. 34. 57.

Minor, supra viridis, subtus viridi-flavescens; fronte, periophthalmiis, genis barbisque aurantio-flavis; vertice coeruleo-viridi; remigibus subtus nigris caudaque minus longa subtusque flavicante viridibus; tectricibus alarum majoribus subjacentibus introrsum flavidis; rostro oculisque albidis; pedibus fuscis. Longitudo corp. 8', caudae 4', c. al. l. 1½'.

SPECIES 18. ARATINGA VIRESSENS LATH.

Buff. pl. 559. Vaill. pl. 57.

Minor, viridis, plumis ad radicem cinereis; remigibus primariis coerulecentibus, ad marginem externum viridibus, subtus coeruleis, secundariis albis; tectricibus alarum longioribus subjacentibus luteis, anterioribus mediis violaceis; cauda brevi, supra viridi, subtus coerulecente; rostro compresso unguibusque albidis; oculis brunneis; pedibus griseis. Longitudo corporis 7', caudae 5½', c. al. l. 1¾'.

Habitat „Papagaio aen contros amarellos“ ad flumen St. Francisci et Amazonum; differt a ps. Xanthopterygio cauda breviore, alis medio non albo maculatis. Sp. 3.

GENUS IV. PSITTACULUS.

Minimus, brachyurus; cauda subcuneata, brevissima; genis periophthalmisque plumosis.

SPECIES 1. PSITTACULUS PASSERINUS.

Tab. XXXIII. M. 1. Juven. 2. Tab. XXXIV Fig. 2. Fœm. (?)

Viridis; axillis, remigibus secundariis uropygioque cyaneis.

DESCRIP^TIO. Corpus minimum, supra viride, subtus flavidus virescens; caput ad frontem et circa oculos flavidus, ad occiput coerulescenti-viride; alae virides, axillis marginaque externo cyaneis, subtus antice in mare cyaneae, in foemina coeruleo-virides, postice malachitaceo chalybeacæ; remiges primariae virides vexillo interno fusco, secundariae cyaneae; dorsum viride, infimum maris cyaneum; cauda alas vix superans, viridis, subflavido marginata, apice inaequalis ac cuneata; rostrum albicans, basi fuscescens; oculi pedesque nigricantes. Longitudo corporis 4' caudæ 1'.

Habitat sub nomine „Cuiú do Certaô“ gregarie in arbustis ad ripam fluminis St. Francisci; juveus et foemina differunt a mare dorso infimo non cyaneo, axillis vix cyaneis, humeris subtus viridibus, remigibusque non coeruleis sed viridibus.

SPECIES 2. PSITTACULUS XANTHOPTERYGIUS.

Tab. XXXIV. M. 1. Fœm. (?) 2.

Flavido-virescens; rectribus alarum mediis luteis; dorso infimo non luteo sed viridi.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine praecedentis, supra, præcipue subtus et in capite flavo-virescens; rectrices alarum mediae luteae, duæ longiores anteriores ad vexillum internum luteae, ad externum virides; remiges virides, extus flavo marginatae scapis nigro violaceis, secundiarum vexillum internum fuscum; alae subtus antice viridi lutescentes, postice malachitaceo rilucentes; cauda alis vix longior supra viridis, subtus malachitaceo lutescens, rectribus angustioribus, apice vix triquetris, flavicanibus; rostrum albido-fuscum; pedes unguisque albidi; digitus externus anticus crassus. Mas.

Vicitat solitarius in plantationibus zæae provinciae Minas Geraes; differt a Sosove Bußl. pl. 450 corpore rostroque minoribus, dorso infimo non luteo. Fig. 2. fœ-



PSITTACULUS *passerinus* Nos. 2 Formosa
Petite Perruche à ailes bleues

Tab. XXXIII.



PSITTACULUS xanthopterygius.

Mas. - 2. Fem. \$

Petite Perruche verte à ailes jaunes

PSITTACULUS gregarius.

Mas. - 4. Fem. \$

Petite Perruche verte.



PSITTACUS xanthops.
Perroquet à front et joues jaunes.

Tab. XXVI

mina canda apice triquetra, corpore supra viridi, subtus fronteque flavo-virilibus, vexillo remigum secundariarum interno flavescente insignem, et forsitan foeminam psittaculi passerini, vel etiam marem (?) foeminae Fig. 4. exhibet.

SPECIES 3. **PSITTACULUS GREGARIUS.** TAB. XXXIV. M. 3. Fom. (?) 4.

Herbaceo-viridis; alis viridibus, cyaneo vel luto non maculatis; rostro subbidendato; cauda alis sublongiore; capite foeminae flavidio.

D E S C R I P T I O. Corpus praecedente vix majus, supra et subtus herbaceo-viride; alae supra et subtus ante herbaceo-vires, subtus postice malachitaceo-nigricantes; remiges ad vexillum externum virides, ad internum nigricantes; uropygium viridissimum; crissum flavicans; cauda alis sublongior viridissima, rectricibus latis, apice triquetris; rostrum flavicans, subbidendatum; pedes sordide albicantes.

Habitat gregariè in campis Minas Geraes, foemina (an ps. *Tirica* Lath.?) capite flavidio. Sp. 2.

SPECIES 4. **PSITTACULUS TUI.** Buff. pl. 456, 1. Vaill. pl. 70.

Psittaculorum maximus, supra viridis, subtus flavidio virescens; fronte lutea; capite coeruleo-virescenti; tectricibus alarum subjacentibus coeruleoscentibus; remigibus coeruleo-viridibus; cauda alis longiore, apice et subtus flavescente; rostro longo, acuto, fusco; pedibus albicantibus. Longitudo corporis $5\frac{1}{2}'$, caudae $2\frac{1}{2}'$, c. alas super. 1'.

Habitat in sylvis fluminis Amazonum.

*
G E N U S V. P S I T T A C U S.

Brachyurus; cauda non cunctata, aequali; corpore gravi.

SPECIES 1. **PSITTACUS XANTHOPS.** TAB. XXVI.

Viridis; fronte, vertice, orbitis, loris rostroque sulphureis; plumis colli corporeque subtus coeruleoscenti marginatis; alis virgcentibus, purpureo vel luteo non maculatis.

D E S C R I P T I O. Corpus robustum, supra viride, subtus flavidio-viride, plumis coeruleo-viridi marginatis; caput ad frontem, verticem, circa oculos, ad genas et supra

aures sulphureum, versus occiput virescens; collum viride, plumis coeruleo-nigro marginatis; tectrices alarum virides, longiores virides, basi nigrae, apice flavo-terminatae; remiges coerulecenti-virides, apice subflavido terminatae, vexillo interno migranti, secundariae totae virides; alae subtus malachitaceo rilucentes; cauda viridi-flavicans, rectricibus exterioribus medio purpureo-maculatis, intermediis totis viridibus, rubro non maculatis; rostrum elongatum, superne nigricans, lateraliter flavicans; pedes nigricantes; oculi flavidio-rubicundi. Longitudo corporis 9', caudae 5 $\frac{1}{2}$ '

Habitat in interiore Minas Geraes, citris aurantiis vicitans; foemina capite minus sulphureo, tectricibus alarum magis flavo terminatis. Sp. 2.

SPECIES 2. PSITTACUS COLUMBINUS. TAB. XXVII.

Viridis, major; fronte, rostro, speculo alarum rectricibusque ad basin purpureis; crista occipitis dependente, viridi, coeruleo-nigroque fasciata; collo subtus rubro-violaceo; margine alarum aurantio; remigibus primariis coerulecentibus.

DESCRIP^TIO. Corpus robustum, viride, plumis apice nigrido-marginatis; caput viride, plumis nigro terminatis, fronte rostroque purpureis; crista occipitis plicatilis, illi psittaci accipitrini similis, apice nigro coeruleoque fasciata; collum subtus pectusque superius violaceo-rubescens; abdomen viride, violaceo-rubescens; femora viridia, plumis vix nigro terminatis; dorsum totum viride; tectrices dorsi alarumque saturate virides, apice subnigro terminatae; remiges primariae coeruleae, ad basin virides, ad vexillum internum nigrae, apice coeruleae, secundariae virides, medio purpureae, aurantio submarginatae; alae ad marginem externum medio flavicantes subtus laete virides, apice nigrae; cauda supra viridis, apice et subtus flavo-virescens, rectricibus ad basin purpureo-maculatis, tectricibus subcaudalibus ad basin flavis; pedes nigricantes. Longitudo corporis 11 $\frac{1}{4}$ ', caudae 5'.

Habitat in sylvis St. Pauli, „Papagayo do bico encarnado“ appellatus. Sp. 1.

SPECIES 3. PSITTACUS MALACHIITACEUS. TAB. XXVIII.

Herbaceo-viridis, immaculatus, cauda sublonga, apice et subtus coerulea.

DESCRIP^TIO. Corpus Aratingam inter et Psittacum intermedium, supra et subtus herbaceo-viride, plumis ad basin nigris; alae virides, subtus coerulecentes; remiges



PSITTACUS columbinus.
Perroquet à cou de pigeon.

Tab XXVII.



PSITTACUS malachitaceus..
Perroquet à couleur verte foncée

Tab. XXVIII.



PSITTACUS Maitaca. *Mao.*

Perroquet à tête pourprée.

PSITTACUS Pumilio.

Perroquette Vain



PSITTACUS Maitaca *fonsc*
Perruche vert à tête pourprée

Tab. XXX

extiores vexillo externo subcoerulecentes, subtus nigrae; cauda longa, viridis, apicis subtusque violacea, vexillo externo rectricis exterioris coeruleo; periophthalmia fusca, rostrum album; pedes nigri. Longitudo corporis $9\frac{3}{4}'$, caudae $4\frac{1}{2}'$, e. alas super. $2'$.

Habitat in sylvis Rio de Janeiro, ab incolis Maitaca vel Sabia-si nominatus: foemina differt a mare remigibus vix coerulecentibus. Sp. 2.

SPECIES 4. PSITTACUS PUMILO. TAB. XXIX. Fig. 2.

Pygmaeus, immaculate viridis; alis viridibus, immaculatis; cauda alis fere breviore, flavidо-viridi, ad basim vix rubro maculata; rostro crasso, olivaceo-nigro.

DESCRIP^TIO. Corpus pumilum, viride, subtus flavescenti virescens; caput coerulecenti-viride; tectrices alarum virides, ad basin nigrae; remiges virides, apice flavidо submarginatae, vexillo interno nigricante; cauda alis fere minor, flavidо-virescens, vexillis internis ad basin rubro submaculatis; rostrum crassum, olivaceo-fuscum; pedes nigri. Longitudo corporis $6\frac{3}{4}'$, caudae $2'$.

Habitat ad ripam fluminis Solimoëns. Sp. 1.

SPECIES 5. PSITTACUS MAITACA.

Mas. TAB. XXIX. Fig. 1. Foem. TAB. XXX.

Mediocris, viridis; humeris, tectricibus alarum mediis subjacentibus, remigibus secundariis caudaeque apice coeruleis; capite maris purpureo, foeminae coeruleo-viridi.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine Turdi, supra et subtus flavescenti-viride, plurimulis quasi exesis; caput maris purpureum, juvenis purpureo viridique maculatum; foeminae viride, fronte coerulea; genae virides; macula postauricularis in mare purpurea, in foemina cinerascens; tectrices alarum flavidо-virides, humerales, marginales mediaeque subjacentes coeruleae; remiges primariae exteriores ad vexillum externum coeruleae, viridi marginatae, ad internum nigrae, apice viridi-fuscae, secundariae virides, subjacentes intus violaceae nigraeque; alae subtus malachitaceo relucentes, ad marginem coeruleae, apice nigrae; cauda longiuscula, alis paulo major, aequaliter supra et subtus viridis, supra ad apicem coerulea, rectricibus ad basin viridibus, ver-

sus apicem coeruleis, intermediis magis viridibus quam coeruleis; rostrum basi nigrum, apice albicans; pedes nigri. Longitudo corporis 8', caudae 5', c. al. sup. 1'.

Habitat in sylvis Rio de Janeiro prope pagum indicum Prezidio de St. Joao, Maitaca, ab aliis Cuiúcuiú, a principe Neovidano psitt. mitratus denominatus; foemina vix minor differt a mare capite non purpureo sed viridi, fronte coerulecente, colore viridi coeruleoque magis pallido. Sp. 5.

SPECIES 6. PSITTACUS FLAVIROSTRIS. TAB. XXXI. Fig. 2.

Mediocris, viridis; plumis capitis coeruleo-virescentibus, flavo-maculatis; genis lorisque viridibus; collo subtus caudaeque apice vix coerulecentibus; rostri apice flavo.

D E S C R I P T I O. Corpus ps. menstruo parum minus, olivaceo-viride, vel supra laete viride; caput virescens, plumis medio flavo-maculatis, apice coeruleo-marginatis, fronte coeruleo-fusca, fasciculo auriculari viridi; nucha viridis, plumis flavo-maculatis; pectus superius subcoerulescens; abdomen femoraque olivaceo-viridia; crissum purpureum, plumulis viridi vel coeruleo-terminatis; alae subtus laete virides margine subflavante; remiges virides vexillo interno fuscescente; tectrices alarum uropygiique olivaceo-virides; cauda brevis, viridis, apice vix coerulescens, ad basin parum purpurascens, vexillo externo 2 rectricum exteriorum coeruleo; rostrum basi fuscum, apice flavicans; pedes oculique nigri.

Habitat in sylvis campestribus Piauhy. Maitaca a nonnullis denominatus; differt a ps. menstruo capite, collo pectoreque non totis coeruleis sed flavo-maculatis, rostroque non rosaceo, a ps. Maximiliani Knhl. fronte modo non rubra.

SPECIES 7. PSITTACUS SENILIS. TAB. XXXI. Fig. 1.

Mediocris, viridi coeruleoque variegatus; syncipite albo; nucha viridi; tectricibus alarum longioribus remigibusque secundariis viridibus; abdomine viridi-coerulecente; rostro flavo-albo; pedibus albis.

D E S C R I P T I O. Corpus psitt. purpureo majus, magnitudine vero ps. menstrui, supra virescens, subtus coerulescens, plumis ad basin albidis; caput ad frontem et verticem albissimum, ad occiput, genas collumque laterale coerulescens, plumis viridi margaritaceis; gula albicans; pectus viridi-coeruleum; abdomen femoraque coeruleo-vi-



PSITTACUS senilis.

Perroquet à tête blanche.

PSITTACUS flavirostris.

Perroquet à mâchoires jaunes



PSITTACUS Diadema.

Tab. XXXII

resentia; crissum anterius virescens, posterius purpureum; nucha, dorsum uropygiumque viridia; tectrices alarum humerales viridi-brunnescentes, longiores virides; remiges primariae coeruleae, apice virescentes, secundariae corulescentes, viridi marginatae; alae subtus virides; tectrices caudales virides; cauda alis fere brevior, coerulea, parum virescens, vexillo retriculum interno ad basin purpureo; rostrum basi flavum, apice album; pedes albi. Sp. 1.

SPECIES 8. *PSITTACUS DIADEMA*. TAB. XXXII.

Major, coeruleo-viridis, plumis fusco non simbriatis; fronte gulaque purpurascens; vertice flavo coeruleo; nucha pectoreque viridibus; alis medio purpureis flavisque; remigibus primarii viridibus; rostro supra albido, sulcato, apice subtusque nigro.

DESCRIP^TIO. Corpus robustum, magnitudine ps. columbini, supra viride, subtus coeruleo-virescens; caput in fronte purpureum, in vertice coeruleo; postic flavicans; genae, lora, collum corpusque subtus coeruleo-viridia; gula flavicans et purpurascens; remiges virides, apice violaceo-nigræ, medio purpureæ luteaque; alæ subtus virescentes margine flavicante; cauda virescens, subtus flavescens rectricibus 3 exteris intus ad basin purpureis; pedes nigri.

Habitat in sylvis fluminis Solimoëns, ps. columbino similis. Sp. 2.

SPECIES 9. *PSITTACUS PULVERULENTUS* LAT.

Buff. pl. 861. Vaill. 92.

Maximus, viridis, cinerascenti-pulverulentus; caput et genae viridia; vertex flavus, pone purpurascens; cauda virescens, apice flava, basi non rubra; humeri dorsumque infimum non rubri sed virides, speculo alarum purpureo; remiges ad basin virides, medio violaceæ, apice et intus nigræ; rostrum flavescens; plunæ capitii nuchæque fusco-marginatae. Longitudo corporis 1° $\frac{1}{2}$.

Habitat in sylvis ad flumen Solimoëns. Sp. 1.

SPECIES 10. PSITTACUS ACCIPITRINUS. TAB. XXXII.

Viridis supra, subtus coeruleo coccineoque fasciatus; capite griseo; crista occipitali longa, coccinea, coeruleo-marginata; remigibus nigris.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine Coracinae garnulae, supra viride, coeruleo hinc inde indutum, plumis ad basin nigris, capistro nigricante; caput, genae, macula auricularis loraque brumescen-*t*-fusca, albido strigilata; crista occipitalis longa, lata, ad basin ciuereo-brunnea, medio coccinea, apice coerulea; collum brunneo-fuscum; pectus, abdomen et femora coccineo coeruleoque fasciata; hypochondria crissimique virescen-*t*a; remiges nigrae, secundariae virides vexillo interno nigrido; alae longae, cruciatae; cauda longiuscula, aequalis, supra viridis, ad apicem subviolacea, subtus nigra; rostrum brunneo-albidum; pedes nigri. Longitudo corporis 11', caudae 6' e. alis 1. 2'

Habitat sub nomine „Anaca“ ferus et mordax prope Villa Nova, pagum ad flumen Amazonum, a Lathamio cum ps. variegato false unitus; differt a ps. accipit. Kuhl. et Buff. pl. 626 collo corporeque subtus non totis purpureis. Sp. 2.

SPECIES 11. PSITTACUS FESTIVUS LATH. Vaill. pl. 129.

Major, viridis; dorsum infimum purpureum, plurimis ad basin flavis; remiges coeruleae, apice nigrae, medio non rubrae; genae, axillae humerique virides; caput viride, ad frontem sanguineum, pone oculos et ad gulam coeruleum; cauda tota vi-ridis, ad basin vix purpurascens; rostrum pedesque subcinerei; femora infra subflaviantia; oculi rubri. Longitudo corporis 1° $\frac{1}{4}$ '.

Habitat ad flumen Içá; foemina mare feroce major dorsoque infimo minus large purpureo. Sp. 4.

SPECIES 12. PSITTACUS AESTIVUS LATH. Vaill. pl. 84.

Major, viridis; caput ad frontem coeruleum, ad verticem, circa oculos, versus ge-*n*as et gulam flavum; humeri speculumque alarum purpurei; margo axillaris, tectri-*c*es caudae semioraque infra flaviantia; plumae colli, dorsi pectorisque apice fusco-*s*imbriatae; remiges ad basin virides, versus apicem coeruleae, introrsum nigrae; alae subtus malachitaceae; cauda media virescens, ad basin purpurascens, ad apicem fla-*v*icans; rostrum pedesque nigricantes.



PSITTACUS accipitrinus. / Anaca. /

Tab. XXXII^a

Variet. 1. Vertex flavicans, antice albicans.

Variet. 2. (VAILL. pl. 87.) Orbitae, genae, gula et regio versns collum anticu luteae; margo axillaris pallide virescens; vertex luteus; genae loraque coeruleo-viridia; femora viridia absque flavo; rostrum nigrum, lateraliter flavicans.

Variet. Juv. 3. Minor; frons parum coerulescens; vertex luteus; genae loraque coeruleo-viridia; femora viridia absque flavo; rostrum nigrum, lateraliter flavicans.

Variet. Juv. 4. Minor; frons vertexque coerulescentes absque flavo; genae loraque viridia; femora viridia absque flavo; humeri subpurpurei; specimen alterum parum robustius circa oculos subflavicans. (An Spec. diversa?)

Habitat in sylvis fl. Amazonum, Papagayo gregō frequenter vocatus.

SPECIES 15. PSITTACUS AMAZONICUS. Lath.

VAILL. pl. 110., BUFF. pl. 547.

Major, 'viridis; dorsum et humeri non rnbri; speculum alarum aurantio-purpurecens; margo axillaris aurantio-flavicans; caput antice coeruleum, flavo variegatum; stria infra oculos et versus gulam flava; remiges coeruleae, apice nigrae; cauda viridis, apice flavicans, versus basin large aurantio-rubra; plumae colli apice fusco-fimbriatae; rostrum albicans; pedes fusi. Longitudo corporis 1° 3 $\frac{1}{4}$ '.

Habitat in sylvis fluminis Amazonum. Sp. 2.

SPECIES 14. PSITTACUS BARRABANDI. VAILL. pl. 154.

Minor, viridis, versicolor; caput, gula nuchaque nigra; genae femoraque infra fulvo-ochracea; collum anticu olivaceum; humeri aurantio-flavi; axillae alaeque subtus purpureae; remiges primariae coerulecenti-nigrae, apice nigrae, secundariae virescenti-coeruleae; dorsum, tectrices alarum abdomenque laete viridia; cauda viridis, apice coerulea, vexillo rectricum interno medio non purpureo sed luteo; rostrum pedesque nigricantes; oculi rubri. Longitudo corporis 8'.

Habitat rarissimus ad flumen Içá. Sp. 3.

SPECIES 15. **PSITTACUS MENSTRUUS.** Buff. pl. 384.

Mediocris, olivaceo-viridis; caput, collum pectusque saturate coerulea; lora nigrida; dorsum, tectrices alarum, abdomen, femora crissumque viridia; tectrices subcaudales purpureae; cauda viridis coeruleaque, rectricibus externis introrsum medio purpureis, extrorsum totis coeruleis, intermediis viridibus; rostrum basi rosaceum, apice fuscens; pedes albicantes; oculi nigri. Longitudo corporis 10'.

Habitat in sylvis flum. Solimoëns; mas pectore et abdome magis coerulecentibus. Sp. 4.

SPECIES 16. **PSITTACUS PURPUREUS.** Lath.

Vaill. pl. 115. Buff. pl. 408.

Mediocris, violaceo-brunnescens; caput fusco-coeruleum; genae coeruleentes; lora nigricantia; nucha, tectrices alarum humerales dorsumque griseo-brunnea, plumis fulvo-terminatis; tectrices alarum humerales et axillares virides; pectus brunneo-violaceum; abdomen obscure rubescens; remiges primariae violaceae, secundariae virides, introrsum violaceae; alae subtus coeruleae; crissum purpurascens; cauda violacea, subtus purpurea, rectribus intermediis subviridibus; rostrum basi flavum, apice fuscum; pedes fusi. Longitudo corporis $7\frac{3}{4}'$.

Habitat ad urbem Parae, a Vaillantio varietas ps. menstrui falso judicata. Sp. 1.

SPECIES 17. **PSITTACUS MELANOCEPHALUS.**

Buff. pl. 507. Vaill. pl. 119.

Minor, viridis, versicolor; alae, dorsum caudaque viridissima; caput nigrum; genae virescentes; gula, lora, collum laterale, femora crissumque sulphurea; nucha ochraceo-rubra; pectus abdomenque sordide albicantia; cauda subtus nigricans; rostrum cinereum; pedes fusi. Longitudo corporis $7\frac{1}{2}'$.

Habitat ad flumen Negro. Sp. 1.



ANODORHYNCHUS MAXIMILLIANI
Perroquet de Sa Maj le Roi de Bavière.

Tab. XI

GENUS VI. ANODORIHYNCIUS.

Araras inter et Aratingas intermedius, familiaris, macrourus, infra nares et supra genas plumis tectus; rostro supra modum crasso, uncinato, edentato; periophthalmis parum, basi mandibulae inferioris tota nudis; cauda gradata, elongata.

SPECIES I. ANODORIHYNCIUS MAXIMILIANI. TAB. XI.

Maximus, cobaltino-coeruleus periophthalmis basique mandibulae inferioris membranosa nudis, flavis; rostro quam maxime crasso, pedibus, alis infra, caudae subtus nigris; rectricibus intermediis reliquis longioribus.

DESCRIP^TIO. Corpus robustissimum, Arara Macaone haud minus, supra subtusque saturate cobaltino-coeruleum, colore vix varians; caput, praecipue rostrum supra modum crassum; caput, nec non collum ac abdomen pallidius cobaltino-coerulea; reliquum corpus saturate cobaltino-coeruleum, plumis basi, raro ad latus internum nigris, scapis omnibus nigris; genae loraque plumosa; periophthalmia parum, basis mandibulae inferioris tota nuda, flava; alae infra caudae subtus nigerrimae; remiges longae, cruciatae; cauda longissima, gradata, supra cobaltino-coerulea, rectricibus intermediis reliquis longioribus; rostrum totum nigrum, quam maxime crassum, compressum, altum, superius apice uncinatum, edentatum, inferius superiore brevius, fornicatum, amplum, suboblique ascendens, supra apice obtusum, medio et latere emarginatum; oculi exigui; nares basales, subsuperae, rotundae; tarsi digitis multo breviore, robusti, depresso, reticulati, nigri; digiti longi, nigri, posticus externus cacteris fere longior; unguis longi, compressi, curvi. Longitudo corporis 2°, 9', caudae, 1°, 7', rostri 3', tarsi 11", digiti postici externi 2½'; altitudo rostri 3'.

Habitat gregarius, parum fugax et ab incolis niger vel Arara pretto nominatus in sylvis campestribus Provinciae Goyatazes prope pagum St. Mariae, mas a foemina non diversus, voce rauca raro vociferans; differt ab Arara hyacinthino a me depicto (Tab. XXIII.), quem Lathamius cum illo erronee commutavit, magnitudine corporis plus quam dupla, rostro quintuplo crassiore, colore corporis non pallide et saffyrine coerulecenti, nec sub sole viridi-resplendente sed saturate cobaltino-coeruleo, genis lorisque non nudis, genis non cinereis, cauda multo longiore etc. ideoque a me tanquam species ab Arara hyacinthino Lath. diversa et ob magnitudinem ac pulchritudinem nomini Maximiliani Josephi Bavariae Regis I., Augustissimi Authoris ac Fautoris itineris nostri per Brasiliam suscepti operumque literariorum a nobis editorum devotissime consecrata.



TROGON pavoninus.

Couroucou vert à bec et ventre rouges du Pérou



TROGON aurantius

Couroucou orange.

Tab XXXVI

C u c u l i.

Insectivori, taciturni, non scansorii sed sedentarii, strigum modo breviterque volantes; digitis frequenter gracillimis, 2 anticus, 2 posticus; rostro arcuato; collo, alis et tarsis plerumque abbreviatis.

GENUS I. T R O G O N. (Pavaô Brasil.)

Brevirostris, taciturnus, solitarius, strigum modo volans; rostro capite breviore, pone latiusculo, vibrissis tecto, ad marginem serrato, apice dentato; tarsis abbreviatis, plumosis; digitis gracillimis, anticus subaequalibus, fere totis fissis, posticus inaequalibus, brevibus, externo non versatili; remigibus brevissimis; cauda elongata, apice trunca; plumis intumescentibus, aureonitentibus; navibus ad basin rostri positis.

S P E C I E S 1. T R O G O N P A V O N I N U S. T A B. XXXV.

Major; corpore supra pectoreque sericeo-viridibus; remigibus candaque immaculate nigris; abdomine rostroque purpureis; tectricibus alarum caudaeque 2 elongatis, sericeo-viridibus.

D E S C R I P T I O. Corpus reliquis speciebus maximum, supra et ad pectus viride, coeruleo cuproque relucens, plumis sericeis, ad basin nigris; caput viride, praecipue circa oculos cupro - relucens; tectrices alarum posteriores longae, desfluentes, sericeae; alae subtus, cauda longa remigesque nigrae; abdomen crissumque purpurea; femora nigricantia, aureo-cupro variegata; tectrices supracaudales sericeo-virides, 2 intermediae virides caudae fere longitudine, versus basin nigrae; rostrum roseum, margine non serratum, apice subdentatum, albicans; oculi pedesque rubicundi; unguis fusi. Mas. Longitudo corporis $11\frac{1}{4}'$, caudae $5\frac{3}{4}'$, caudae al. long. 4'

Habitat in sylvis Tabatingae et Marabitannas. Sp. 2.

S P E C I E S 2. T R O G O N A U R A N T I U S. T A B. XXXVI.

Abdomine crisoque aurantio-miniaceis; tectricibus alarum humeralibus et scapularibus viridibus, anterioribus cinereo-punctulatis; occipite pectoreque violaceo-chalybeis; syncipite gulaque nigris.

D E S C R I P T I O. Corpus praecedente parum minus; synciput, periophthalmia, gula femoraque nigra; occiput, nucha collareque virescenti-coeruleo reluentia; dorsum tectricesque humerales viridi-aurea, nec non cupro reluentia; tectrices supracaudales smaragdinæ; tectrices alarum ciuereac, albido punctulatae vel tenerime crenu-

Iatae; remiges nigrae, antrorsum albo marginatae, secundariae nigrae, subtus ad basin albidae; hypochondria cinerea; pectus posterius, abdomen crissumque miniaceo-aurantia; cauda supra viridi-chalybea, apice subtusque nigra, rectricibus intermediis totis viridi-chalybeis, apice nigris, 5 externis gradatis, medio immaenlate albis, ad basin nigris, 2 subsequentium vexillo externo viridi-chalybeo, interno nigro; rostrum cimerascens, serratum; pedes nigri, albido-pulverulentii. Longitudo corporis $9\frac{3}{4}'$, caudae $4\frac{3}{4}'$, caud. alis long. $5\frac{5}{4}'$

Habitat in sylvis Rio de Janeiro. Sp. 1.

SPECIES 3. TROGON CASTANEUS. TAB. XXXVII.

Coffeacco-brunneum; collaris pectorali albo; abdomine miniaceo; tectricibus alarum brunneis, nigro-lineatis; cauda castanca, apice nigra; rectricibus exterioribus nigris, apice albo-undulatis albo-que fasciatis; rostro apice flavicante.

DESCRIP^TIO. Corpus praecedente minus, supra et ad collum coffeacco-brunneum; remiges breves, nigrae, extrorsum albo-marginatae, secundariae nigrae, subtus albicantes; abdomen crissumque miniacea, plumis ad basin nigridis, medio albidis; cauda subtus nigra, rectricibus 2 intermediis castaneis, lateraliu vexillo interno castaneo, externo bruneo-fusco, subrelucente, 2 exterioribus nigris, ad marginem exterum albidis, versus apicem parum nigro-strigilatis, apice albis; rostrum supra et ad basin nigricans, apice flavicans; oculi nigri. Longitudo corporis 9'; caudæ 5', caud. al. long. 4'.

Habitat in sylvis Tabatingae, fructibus insectisque vicitans. Sp. 2.

SPECIES 4. TROGON SULPHUREUS. TAB. XXXVIII. M. 1. Foem. 2.

Minor, virescens; capite, collo, dorso uropygioque viridi relucens; fronte, gula, femoribusque nigris; tectricibus alarum omnibus nigris, albo-crenulatis; abdomine sulphureo; cauda cupreore-lucente, subtus nigra, rectricibus 3 exterioribus nigro-alboque fasciolatis.

Foemina, nigra; abdomine crisoque subaurantio-sulphureis; tectricibus alarum nigris, transverse albo lineolatis; cauda nigra, rectricibus externis albo nigroque fasciolatis.

DESCRIP^TIO. Corpus exiguum; caput supra, collum, dorsum uropygiumque aureo-viridi splendentia; frons, periophthalmia gulaque nigra; pectus, abdomen crissumque sulphureo-aurantia, plumis ad basin cimereis, medio albis; rectrices intermediae cupreochalybeae, apice nigrae, lateraliu vexillo externo flavo-cupreo relucente, in-



TROGON castaneus.


Couroucou châtaignier

Tab XXXVII



TROGON sulphureus. 1. Mas. 2. Fem.
Couroucou sulphureux.

Tab. XXXVIII.



TROGON *variegatus*

Tab. XXXVIII ♂.

urno apiceque nigris, exteriore nigrac, ad marginem et versus apicem nigro albo-ue fasciolatae, apice albæ; rostrum albescens, serratum; oculi nigri; pedes nigri, ulverulenti. Longitudo corporis 8', caudæ 5', caud. al. long. 3½'

Habitat in sylvis Tabatingæ, propugnaculi Brasiliæ limitanei ad flumen Solimoëns. Sp. 2.

SPECIES 5. TROGON VARIEGATUS. TAB. XXXVIII^a

ectricibus alarum pulverulentis; capite colloque violaceo-chalybeis, viridi circumcinctis; dorso cupreο-viridi; pectore abdomineque miniaceo-purpureis; rectricibus caudæ coerulescenti viridibus, exterioribus albo nigroque fasciolatis.

D E S C R I P T I O. Corpus præcedente parum majus; caput supra violaceo-chalybeum, scipite virescenti, fronte, periophthalmis nec non gula nigris; collum coeruleum, infra viridi-aureo cinctum; dorsum tectricesque humerales cupreο-aurea; tectrices alari reliquæ griseæ et quasi albo nigroque punctulatae vel pulverulentæ; tectrices immales inferiores cinereo-albicantes; pectus, abdomen crissimque miniaceo-purpurea; femora nigra; uropygium viridi-setaceum; cauda supra viridi-chalybea, apice subtusque nigra rectricibus 5 exterioribus albo nigroque fasciolatis; rostrum albescens, serratum; pedes nigri. Longitudo corporis 8¾'.

Habitat in Brasilia. Sp. 1.

SPECIES 6. TROGON CURUCUI VEL STRIGILATUS. Lath.

Curucui à ventre rose. Vaill. pl. 1. Buff. pl. 537, 452.

Major, viridis; caput, dorsum, pectus collumque viridi-aurea; cauda nigra, rectribus intermediis supra subvirescentibus, exterioribus albis nullis; tectrices alarum griseæ, albo nigroque lineolatae; abdomen crissimque laete purpurea; frons, periophthalmia, lora femoræ nigra; rostrum flavicans; oculi albo-atri. Foemina cireo-nigra, abdomine rubro.

Habitat in sylvis fluminis Solimoëns; Trogon strigilatus Lath. Foemina Cu-ucui exhibet. Spec. 3.

SPECIES 7. TROGON VIOLACEUS. Lath.

Curucui à chaperon violet. Buff. pl. 195.

Curucui à ventre jaune. Vaill. pl. 5.

Major. viridi-violaceus; caput, collum, cauda supra uropygiumque violacea; ab omnem crissumque sulphurea; tectrices alarum nigerrimae, non crenulatae; rectrices exteriores ad basin nigrae, reliquae albae, nigro non fasciolatae; dorsum viridirenum; gula femoraque nigra; rostrum albo-cinereum; palpebrae aurantiae.

Habitat sub nomine Surucua, Curucuo vix minor in sylvis Rio de Janeiro Spec. 2.

SPECIES 8. TROGON VIRIDIS. Lath.

Curucou de Cayenne. Buff. pl. 195.

Major, niger viridisque; caput, gula femoraque nigra; pectus cinerascens, vix vi idi-aureum; tectrices alarum nigrae, longiores, apice transversum albo lineatae; abdomen crissumque aurantio-sulphurea; cauda nigricans, supra vix virescens, rectricibus exterioribus albo nigroque fasciolatis; dorsum viride; uropygium viridi-coeruleum; rostrum nigrum; oculi brunnei. Foemina tota nigricans, abdomine sulphureo; rectricibus exterioribus albo nigroque fasciolatis, tectricibus alarum omnibus transversim albo lineatis. Mas. 1. Foem. 2.

Habitat in Sylvis fl. Solimoëns.

SPECIES 9. TROGON COLLARIS. Vieillot.

Rosalba. Vaill. pl. 6.

Curucui. Lath.

Subminor, viridis; caput, collum dorsumque viridi-aurea, cupreo subreluentia; rons, gula femoraque nigra; vitta pectoralis alba; abdomen crissumque roseo-purpurea; tectrices alarum omnes lineis nigris albisque transversim undulatae; cauda supra viridi-aurea, apice nigra, rectricibus exterioribus albo nigroque fasciolatis; uropygium viride; rostrum flavicans. — Foemina maiuscula, cinereo-nigra, tectricibus alarum cinereo-subpunctulatis, rectricibus exterioribus albo nigroque fasciolatis.

Habitat in sylvis fl. Amazonum. Sp. 2.



BUCCO Rubea.

Barbu Rouge-gorge.

CYPHIDS macroura.

Barbu à doigt long.

GENUS II. CYPHOS SIVE TAMATIA.

Tacrorhynchus, taciturnus, solitarius, muscicaparum modo volans; capite crasso; rostro longo, ad basin vibrissis nigris tecto, lateraliter subcompresso, apice dentato, adunco; rictus infra oculos protenso; alis, nec non cauda tarsisque brevibus; digitis anticis subfisis, inequalibus, externo subrobusto; capite crasso; lingua tenui, apice acuta; naribus rotundis.

SPECIES I. CYPHOS MACRODACTYLUS. TAB. XXXIX. Fig. 2.

Timor, brunnescens; capite rufo; loris collarique nigris; mucha, stria supra oculos, nec non gula fulvis; macula pectoris alba; tectricibus alarum fulvo nigroque marginatis; abdomine brunnecente, nigro fasciolato.

DESCRITIO. Corpus passerinum, supra fusco-brunneum; caput immaculate casanum, supra oculos albo strigilatum, infra et post oculos nigrum; gula maculaque pectoris albantes; collare anticum nigrum, versus aures longiusculum; mucha rufescens; gula albo-fulvescens; tectrices alarum dorsique fulvo nigroque marginatae, bdominis, crissi uropygiique rufescentes, nigro fasciolatae; remiges subtus ad basin alantes; cauda brunneo-fusca, immaculata; rostrum nigrum, trigonum, basi depresso; pedes albantes; digitus foeminae exterior iusu natura elongatus. Longitudo corporis 5', caudae 2 $\frac{1}{2}'$ c. alis long. 2'.

Habitat in sylvis flum. Amazonum. Mas a foemina nisi digitis brevibus diversus. Sp. I.

GENUS III. BUCCO (Barbudo BRASIL.)

Cypho simillimus, rostro modo magis arcuato, minus elongato, non adunco, tarsisque brevioribus.

SPECIES I. BUCCO RUBECULA. TAB. XXXIX. Fig. 1.

runneo - cineraceens; capite caudaque immaculate cinereis; collo antico ferrugineo; genis, nec non loris abdomineque albis.

DESCRITIO. Corpus magnitudine Rubeculae, supra ferrugineo - cineraceens, plumis d basin nigris; dorsum tectricesque alarum brunnea; remiges cinereo-fuscae, secundariarum margine externo et interno fulvo; alae subtus antice ochraceae; rostrum eden-

atum, pedesque nigrantes; oculi castanei. Longitudo corporis $5\frac{1}{2}'$, caudae alis longioris $2'$. Femina.

Habitat prope pagum Malhada, fluminis St. Francisci proximum. Sp. 1.

SPECIES 2. BUCCO RUFUS. TAB. VI. Fig. 1.

Rufus; capite lorisque cinereis, scapis plumarum albis; fronte et collo, praecipue lateral i juguloque rufis; collari antico albo; dorso, tecticibus alarum, pectore caudaque supra rufescens; abdomine albido.

DESCRIP^TIO. Corpus Fringilla domestica nonnihil majus, supra et ad pectus immaculata rufescens, collo laterali, nucha fronteque rufis; caput, genae loraque cinerea; plu- mae ad angulum maxillae inferioris albentes; gula albido-ferruginea; jugulum trans- verse album; abdomen crissumque sordide albida; remiges nigro-fuscae, ad marginem internum fulvescentes; canda supra rufa, subtus cinereo-rufescens, scapis ferrugineis; rostrum lateraliter compressum vel aduncum, non dentatum, nigrum, maxilla infe- riore medio rufa; pedes albescentes; oculi nigri. Mas. Longitudo corporis $5\frac{3}{4}'$, cau- dae $2\frac{1}{2}'$, e. alis long. $1\frac{1}{4}'$, rostri $8''$, tarsi $7''$.

Habitat in sylvis fl. Amazonum. Sp. 2.

SPECIES 3. BUCCO STRIATUS. TAB. VI. Fig. 2.

Fusca; capite, jugulo dorsoque rufo-striatis; collari antico albo, alioque nigro; cauda longiuscula, imma- culata fusca; abdomine cinereo-fulvescente.


DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine Alaudae pratensis; caput, gula collumque nigran- tia, plumis medio longitudinaliter rufo striatis; stria a genis supra oculos rufa; tectrices dorsi anterioris alaeque fusco-brunneae, longitudinaliter rufo striatae; dorsum posterius, remiges caudaque olivaceo-brunnea, immaculata; remiges ad basin vexillumque in- ternum et externum ochraceae; alae subtus ochraceae; collare pectorale triplex, album scilicet, nigrum ferrugineumque; abdomen crissumque cinereo alboque rufescens; rostrum nigrum; pedes albo-pulverulenti; oculi flavidio-rubri. Longitudo corporis $7\frac{1}{2}'$, caudae $5\frac{1}{2}'$, e. alis l. $2\frac{1}{2}'$, rostri $11''$.

Habitat sub nomine Sacuru in sylvis Rio de Janeiro, Bahiae; mas col- lari ferrugineo vivaciori.



BUTUCÚ rufus & striatus
Barbu roux et rayé

Tab XL



BUCCO albifrons & nigrifrons.

Tab XLI



MACROPUS phasianellus.
Coucou-Pucou

Tab. XLII

SPECIES 4. BUCCO NIGRIFRONS. TAB. XLIII. Fig. 2.

Maximus, familiaris, vociferans, immaculate plumbeo-niger, subtus nigro plumbeus, axillis subspinosus.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine Turdi, fronte, gula, cauda, nec non remigibus primariis nigrescentibus, reliquum nigroplumbeum, plumbis mollibus, suberispis; rostrum miniaceum, arcuaturn, edentatum; nares patulae, rotundae; pedes oculique nigri. Longitudo corporis $10\frac{1}{4}'$, caudae $5\frac{1}{3}'$, c. alis l. $5\frac{1}{3}'$, rostri $1\frac{1}{2}'$.

Habitat sub nomine „Perú do mato“ familiaris rostroque elevato vociferans in sylvis fluminis Solimoëns; mas a foemina non diversus differt a cuculo calcato Linn. tectricibus alarum non albo maculatis. Sp. 2.

SPECIES 5. BUCCO ALBIFRONS SIVE LEUCOPS. TAB. XLIII. Fig. 1.

Maximus, solitarius, immaculate plumbeo-niger, subtus nigro-plumbeus; fronte gulaque fulvido-albis, axillis mucronatis.

DESCRIP^TIO. Haud differt a Buccone Albifronte fronte modo gulaque albis rostroque minaceo sere minore.

Habitat voce haud garrula solitarius et volans more cuculorum in campis Provinciae Piauhy Sp. 3.

GNEUS IV. MACROPUS. (Alma do Gato o do campo Bras.)

Cuculinus; tarsis elevatis; cauda elongata, dependente, gradata, inacquali; alis breviusculis; rostro trigono, perarcuato, edentato; naribus latralibus, oblongis; collo non abbreviato; digitis fissis.

SPECIES 1. MACROPUS PHASIANELLUS. TAB. XLII.

Gracilis, olivaceo-fuscus supra; corpore subtus, gula caudaeque apice albis; crista occipitali rufescente; jugulo pectoreque albo nigroque maculatis; rostro tenui-

DESCRIP^TIO. Corpus Penelopi simile, gracile, supra olivaceo-brunnescens vel fuscum, tectricibus dorsi et alarum rectricibusque albo terminatis; caput fuscum, pone

rufescens, cristatum; stria auricularis, gula, abdomen, crissum femoraque alba; jugulum pectusque nigro-brunnea, albo-fulvo maculata; remiges suscae, breves; cauda elongata, inaequalis; rostrum tenue, supra nigricans, subtus albidum; pedes albicantes. Longitudo corporis 1 $\frac{1}{2}'$, caudae 8', c. alis l. 5 $\frac{1}{2}'$, rostri 13".

Habitat in sylvis Tonantins, fluvii lateralis fl. Solimoëns.

SPECIES 2. MACROPUS CAIXANA. TAB. XLIII. M. 1. Foem. (?) 2.

Minor, castaneus; pectore, abdomineque anteriore, hypochondriis alisque subtus rufocastaneis; rostro magis arcuato, castaneo; cauda supra subtusque castanea.

DESCRIP^TIO. Corpus Cuculo Cayano sere duplo minus, magisque supra et subtus castaneum; differt adhuc ab illo rostro rubro, collo, pectore, hypochondriis, cauda subtus, abdomine crisoque anteriore laete castaneis, cauda minus elongata, aequa gradata licet, ad apicem nigrescenti alboque terminata. Foemina mare majus gaudet capite cinerascente, oculis flavis pedibusque nigris. Longitudo corporis maris 10', caudae 6 $\frac{1}{2}'$, c. alis l. 4 $\frac{1}{2}'$.

Habitat in sylvis fluvii Tonantins. Sp. 2.

GENUS V. G A L B U L A. (Joaô-tolo BRASIL.)

Brachyptera, insectivora, tacitura, non scansoria, sedentaria, stupida; rostro elongato, capite duplo longiore, ad basin vibrissis tecto, cuneato, tetragono, recto vel subarcuato, apice acuto; digitis anticis gracilibus, medio connatis, postico interno minutiori, rarissime nullo; tarsis minutis; lingua longiuscula, tenui, acuta.

SPECIES 1. GALBULA ALBOGULARIS. TAB. LVII. Fig. 1.

Minor, violaceo-nigricans; capite fusco-brunneo; gula rostroque albidis; cauda brevi, aequali.

DESCRIP^TIO. Corpus reliquis minus, nigricans; caput nuchaque fusco-brunnea; periophthalmia, macula auricularis gulaque alba; tectrices dorsi alarumque anteriores maris viridi-violaceae, foeminae violaceae; remiges subviolaceo-nigrae, ad basin albicantes; pectus maris nigro-virescens, foeminae fusco-brunneum; abdomen




MACROPOUS Caixana. 1. Mas. 2. Fem.

Tab. XLIII.



GAIBULA *tombacea*. Fam.

Tab. LVIII



CALBULA , albogularis , tridactyla

Tab. LVII.

brunneo-nigricans, medio subfuscens; cauda brevis, aequalis, maris virescenti-violacea, foeminae violacea, subtus nigra; rostrum acute trigonum, subarcuatum, alboscapens; oculi nigri. Longitudo corporis $5\frac{3}{4}'$, caudae $2\frac{1}{4}'$, c. alis 1. 1', rostri $1\frac{1}{3}'$.

Habitat in sylvis ad urbem Param. Sp. 2.

SPECIES 2. GALBULA TOMBACEA. TAB. LVIII.

Mediocris, viridi-aurea; gula pectoreque violaceo-viridibus; fronte brunnescente; tectricibus dorsi cupreos aureis; cauda supra viridi-violacea, subtus rufa; rostro breviusculo, nigro.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine Jacamari, supra cupreо-aureum fronte brunnescente, subtus ad jugulum et pectus viridi-aureum; abdomen, crissum caudaque subtus castanea; tectrices alarum caudaque supra viridi-violaceo aureae; remiges primariae nigro-fuscae; alae subtus ad basin vix albicantes magisque castaneae; cauda longior quam in Jacamare; rectrices intermediae sublongiores, violaceo-virides, exteriore subbreviore, fere totae castaneae; rostrum nigrum, brevius quam in Jacamare, foeminae parum longius. Longitudo corporis 7', caudae $3\frac{1}{2}'$, c. alis 1. $2\frac{1}{2}'$, rostri $1\frac{1}{3}'$.

Habitat in sylvis fl. Amazonum; vicitat sphegibus, formicis. Sp. 2.

SPECIES 3. GALBULA TRIDACTYLA. TAB. LVII. FIG. 2.

Nigricans; digitis tridactylis; fronte, genis, gula fulvo-strigilatis; pectore abdomineque medio albis; crisco nigro.

DESCRIP^TIO. Corpus Galb. albirostri affine, supra fusco-nigricans, violaceo subrelucens; caput brunneo-nigricans, nec non lora gulaque fulvo-strigilata; jugulum brunneo-nigrum, pectus abdomineque medio alba; hypochondria cinereo-nigra; cauda subaequalis, breviuscula, nec non remiges fusco-nigricantes; alae subtus ad marginem humeralem nigricantes, ad basin remigum albicantes; rostrum pedesque nigri. Longitudo corporis 7', caudae $2\frac{1}{2}'$, c. alis 1. 2', rostri $1\frac{3}{4}'$.

Habitat in provincia St. Pauli. Sp. 1.

P i c i.

(P i c a - p a ô Bras.)

Scansores, insectivori, frequenter solitarii, volatu de- et ascendentis; rostro acuto, trigono, cuneato, recto; collo tenui, distincto; rectricibus rigidis, ad scandendum adjuvantibus, intermediis sublongioribus; tarsis subelevatis; digitis plus quam semifassis, exterioribus anticis 2 et posticis 2 elongatis; lingua jaenatoria, apice setis retroversis munita; naribus basalibus, ovatis; ossibus hyoidis supra caput recurvis.

GENUS I. P I C U S.

SPECIES 1. PICUS ROBUSTUS. TAB. XLIV.

Major, niger; capite cristato, gula colloque purpureis; pectore, abdomen, femoribus crisoque fulvis, nigro-fasciatis; dorso ochraceo; remigibus nigris, ad vexillum internum fulvo fasciatis; cauda immaculate nigra.

DESCRIP^TIO. Corpus P. Martio haud minus; caput purpureum, breviter cristatum; macula supra aures nigra, in mare infra aures albo cincta; genae, gula collumque purpurea; nucha inferior, pectus, abdomen, crissum femoraque fulva, nigro fasciata; dorsum uropygiumque ochracea; remiges nigrae, vexillo interno fulvo late fasciato, primariae apice nigrae, fulvo subterminatae; alae subtus antice ochraceae, postice ochraceo nigroque fasciatae; cauda rigidissima, alis subbrevior, scapis nigris crassis; rostrum supra et ad basin fuscum, ad apicem albicans; pedes nigri; oculi sulphurei. Longitudo corporis 11 $\frac{3}{4}$, caudae 5', e. alis l. 1 $\frac{1}{4}$ ', rostri 1 $\frac{3}{4}$ '.

Habitat in sylvis Provinciae Rio de Janeiro, foemina vix cristata collo purpureo nigroque submaculato. Sp. 3.

SPECIES 2. PICUS ALBIROSTRIS. TAB. XLV. M. 1. Foem. 2.

Majusculus, niger, albo-variegatus; gula, collo subtus, pectore toto striaque infra oculos auresque nigerimis; vitta colli laterali alba a naribus malisque versus dorsum medium et infra humerum excurrente. — Mas crista maculaque supra angulum maxillae purpureis; macula supra aures nigerrima, infra albo marginata. Foemina fronte cristaque verticali nigris, occipitali purpurea, vitta infra oculos auresque non purpurea sed nigra, aliaque tota alba.

DESCRIP^TIO. Corpus praecedente parum minus; caput maris totum purpureum, cristatum; stria pone nares nigra, aliaque alba; macula ad mala alba, infra oculos



PICUS robustus
Charpentier à cou rouge


Tab. XLIV



PICUS albirostris.

Le Soldat

Tab XLV.



PICUS campestris

Pic des champs

Tab. XLVI



PICUS Junana
Charpentier canelle.

Tab XLVII.

purpurea, supra aures nigerrima, infra albo marginata; synciput foeminae nigrum, cristatum, occiput purpureum, cristatum; stria infra oculos et aures nigra; vitta a na-ribus malisque ad latera pectoris usque ad medium dorsum alba; gula, collum, pectus totum tectricesque alarum nigerrima; abdomen, femora crissumque fulva vel alba, nigro fasciata; alae subtus axillaeque albae; vexillum remigum internum ni- grum, ad basin album, externum remigumque apex fuliginoso fuscescens; dor- sum medium album, nigro-maculatum; uropygium nigrum; rectrices nigrantes, ri-gidissimae; rostrum albicans, supra nares canaliculatum; pedes coerulei; oculi flavo- rubri. Longitudo corporis 11'.

Habitat sub nomine Soldado in sylvis Rio de Janeiro fluminisque St. Fran- cisci, rostro pulpitate longisonans. Sp. 3.

SPECIES 3. PICUS CAMPESTRIS. (A.Z.) TAB. XLVI.

Mediocris, supra subtusque sulphureo fasciolatus; capite gulaque nigris; periophthalmis albis; collaris aureo-flavo; dorso alisque brunneo-fuscis, luteo fasciolatis.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine Merulae, supra subtusque sulphureo nigroque fusco fasciolatum; caput brunneo-nigricans, vel nigrum; periophthalmia sordide al- bida; malae nigrae, albo punctulatae; gula jugulumque nigerrima; macula auricula- ris, nucha collumque aureo-flava; remiges brunneo-fuscae, vexillo exteriore albo- flavo maculato, interiore versus basin albo flavicante, secundariarum ad marginem albo flavo fasciolato, scapis flavis; dorsum infimum album; uropygium flavicans, nigro fasciolatum; cauda rigida, nigricans, rectricibus nonnullis flavo fasciatis, 2 intermediis fuscescentibus; rostrum nigrum; pedes nigro-coerulei; oculi brunnei. Lon- gitude corporis 11 $\frac{1}{4}$ ', caudae 4 $\frac{1}{2}$ ', c. alis 1. 2', rostri 1 $\frac{1}{3}$ '.

Habitat gregarie non scandens sed in terra saliens et Pica-paô do campo nomi- natus in locis et viis campestribus provinciarum Rio de Janeiro et Minas Geraes, insecta e sterecore mulorum extrahens et voce gridula iter facientes concomitans. Sp. 2.

SPECIES 4. PICUS JUMANA. TAB. XLVII. M. I. Fom. 2.

Mediocris, cristatus, supra et subtus cinnamomeus; axillis, dorso infimo femoribusque virescenti-ochra- ceis; cauda immaculata, nigrescente.

DESCRIP^TIO. Corpus Merula vix majus, cinnamomeum, vitta marii pur- purea; dorsum infimum uropygiumque ochracea, raro virescentia; hypochondria femo-

raque flavidio-ochracea; remiges fusco-nigricantes, versus basin fulvo ferrugineoque fasciatae, secundariae castaneae, introrsum ochraceo nigroque fasciatae; rostrum acute trigonum, album; pedes oculique albido-coerulei. Longitudo corporis 11', caudae 4½', c. alis l. 2½' rostri 1', 1"

Habitat secundum trihūm indicam Jumana a me nominatus in sylvis fl. Amazonum. Sp. 4.

SPECIES 5. **PICUS LINEATUS.** TAB. XLVIII. Mas. 1. Foem. (?) 2.

Majusculus, niger, albo-lineatus; capite cristato mystaceque purpureis; gula alba, nigro-striata; periophthalmiis maculaque supra aures cinereis; stria a naribus et infra oculos non nigra sed fulvescente, infra aures usque infra humeros et supra scapulam alba.

D E S C R I P T I O. Corpus P. Albirostri fere majus, nigrum; caput brevi cristatum, immaculate purpureum; macula auricularis non nigra sed cinerea; stria malaris non late sed longitudinaliter purpurea, aliaque a naribus infra oculos fulva; gula alba, nigro striata; collum anticum et posticum, pectus, dorsum, alae caudaque nigra; abdomen, crissum, femora hypochondriaque alba, nigro-fasciata; collum pectusque lateralia, axillae scapulaeque albicantia; alae subtus flavidio-albae; remiges nigricantes vexillo interno flavicante; cauda nigra, rigida; rostrum nigricans, linea supra nares aspera; oculi albicantes; pedes coerulei. Longitudo corporis 10' 1"

Habitat in sylvis provinciae Rio de Janeiro, Pica paõ vocatus et ab autheribus haud raro cum aliis speciebus commutatus; mas a foemina mystace purpureo minore, pectoreque minus nigro et raro remigibus apice albis differre videtur. Sp. 5.

SPECIES 6. **PICUS FLAVESCENS.** TAB. XLIX. M. 1. Foem. 2.

Mediocris, niger sulphureusque; capite cristato, nucha, gula, uropygio femoribusque immaculate sulphureis; dorso, lectricilus alarum remigibusque nigro sulphureoque fasciatis; cauda, collo inferiore, pectore ab domineque nigerrimis.

D E S C R I P T I O. Corpus P. campestri vix majus, subtus nigrum, supra nigro subvittatum, sulphureoque fasciolatum; crista capitis sulphurea, longe dependens; alae subtus axillaeque sulphureae; remiges primariae atrae, vexillo interno medio sulphureo-fasciato, secundariae nigrae, sulphureo-fasciolatae apiceque albo-margiatae; cauda



PICUS lineatus. Mas. 2 Form

Tab XLVIII



PICUS flavescens. 1. Mas. 2. Fem.



PICUS Dominicanus. From a Spec.

Tab L.



PICUS *x* ochraceus. *x* flavicans.

Tab. LI

rigida, nigra; rostrum nigrum, maxilla inferiore albescente; pedes nigro-coerulei. Longitudo corporis $10\frac{1}{2}'$, caudae $4\frac{1}{4}'$, rostri $1\frac{1}{2}'$.

Habitat solitarius et scandens, Pica-pao da crista amarella appellatus in sylvis provinciae Rio de Janeiro; mas a foemina differt mystace malari purpureo. Sp. 4.

SPECIES 7. **PICUS DOMINICANUS.** (A.Z.) TAB. L. M. 2. F. oem. 1.

Mediocris, supra niger; capite, nucha corporeque subtus albis; stria post aures nigra.

D E S C R I P T I O. Corpus magnitudine Merulae, supra nigrum, capite, collo, uropygio, pectore, abdomine, femoribus crisoque albis; remiges atrae; cauda nigra, rigida, ad basin subtusque alba nigroque maculata; alae subtus nigrae; stria ab auribus versus nucham nigra; nucha maris, nec non abdomen foeminae intermedium sulphurescens; rostrum nigrum; pedes albo-coerulei. Longitudo corporis $10'$, rostri $12''$.

Habitat familiaris et non scandens in campis Minas Geraes, insectis vicitans. Sp. 3.

SPECIES 8. **PICUS OCHRACEUS.** TAB. LI. Fig. 1.

Mediocris, supra ferrugineus nigroque maculatus, subtus niger; macula auriculari nigrescenti; plumis abdominis rufo marginatis; rostro breviore.

D E S C R I P T I O. Corpus magnitudine Turdi, Pico flavescenti simile, magnitudine vero minus, coloreque corporis rufo, maculis nigris subcordatis et plumis abdominis rufo marginatis diversum; caput, collum posticum, gula semoraque ferruginea, fronte maris juguloque nigro mixtis; macula auricularis nigrescens; collum laterale ferrugineum, nigro interdum striatum; periophthalnia nigra; nucha et dorsum rufa vel ferruginea nigroque oculata vel maculata; tectrices alarum rufae, nigro subcordate maculatae; remiges ad basin rufae, medio rufo fasciatae, primariae ad apicem atrae; alae subtus ferrugineae; pectus abdomenque superius nigra plumis fulvo-marginatis, inferius rufescens; crissum nigrum, rufo punctatum; cauda nigra, rigida; rostrum breviusculum, nigrum; pedes nigrantes; oculi flavi. Longitudo corporis $9'$, rostri $1'$.

Habitat in sylvis Amazonum solitarius et scandens; mas differt a foemina mystace purpureo, longo. Sp. 2.

SPECIES 9. PICUS FLAVICANS. TAB. LI. F. oem. Fig. 2.

Medioctris, stramineus, subcristatus; alis brunneo-fuscis, tectricibusque stramineo-marginatis; canda nigricante.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine praecedentis, supra et subtus totum ochraceo-stramineum, dorso subrufescente; remiges fusco-brunneae vexillo externo brunnescente, interno fusco, secundariarum stramineo; rostrum flavicans, acute trigonum, subarcuatum; pedes nigro-coerulecentes. Longitudo corporis $9\frac{1}{3}'$.

Habitat in sylvis fl. Amazonum; mas (Buffon pl. 509) differt a foemina a nobis depicta mystaceo purpureo. Sp. 1.

SPECIES 10. PICUS FLAVIFRONS. TAB. LII. M. 1. F. 2.

Minor, niger; fronte, gula juguloque flavis; pectore intermedio, vertice occipiteque maris purpureis, occipite foeminae nigro; pectore anteriore olivaceo; dorso infimo uropygioque albis.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine Alaudae, supra violaceo-nigrum, dorso infimo, vexillo remigum secundiarum interno uropygioque albis; frons aurea, ad apicem nigro striata; occiput maris purpureum, foeminae nigrum; genae, macula auricularis, periophthalmia collumque laterale nigra; gula jugulumque aurea; pectus superius cinereo-olivaceum, inferius medio late purpureum; abdomen intermedium purpurascens, laterale, hypochondria semioraque flavo nigroque fasciolata; crissum nigrum, apice flavescentes; canda alis vix minor, nigra, rectricibus intermediis acuminatis; rostrum pedesque nigri; oculi bruniti. Longitudo corporis $7\frac{3}{4}'$, rostri 1.

Habitat in sylvis provinciae Rio de Janeiro. Sp. 2.

SPECIES 11. PICUS MACROCEPHALUS. TAB. LIII. Fig. 2.

Minor, olivaceo-viridis; capite elongato, purpureo, non cristato; genis, periophthalmis maculaque auriculari fusco-olivaceis; stria aurea, aliaque olivacea a genis versus nucham; gula aurea; corpore subtus aureo nigroque fasciolato.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine Alaudae, supra olivaceo-viride, subtus aureo nigroque fasciolatum, pluuis capitidis ad basin olivaceis, ad apicem purpureis; alae subtus



PICUS *flavifrons*. *Macq. & Temm.*

Tab. LII.



PICUS, *guttatus* & *macrocephalus*.

Tab. LIII.



PICUS rubrifrons. 1. *Mas*. 2. *Fem.*

Tab. LV

ochraceae; axillae ochraceo-flavae; vexillum remigum externum olivaceo-viride, internum fuscum, medio ochraceum, apice suscens; cauda rigida, alis major, ad basin olivaceo-virescens, apice nigricans; rostrum nigrum; pedes coeruleo-nigri. Longitudo corporis $7\frac{1}{2}'$, caudae 5', c. alis long. 13", rostri 11".

Habitat in sylvis Amazonum. Sp. 1.

SPECIES 12. **PICUS GUTTATUS.** TAB. LIII. Fig. 1.

Minor, olivaceo-viridis, supra nigro-fasciolatus, subtus nigro-guttatus; fronte nigra; occipite purpureo, non cristato; periophthalmiis maculaque auriculari albis; gutture albo, nigro striato.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine praecedentis; caput antice nigrum, postice purpureum, circa oculos auresque album, mystace maris purpureo; gula alba nigroque variegata; pectus, crissum uropygiumque ferrugineo-olivacea, punctis nigris guttata; abdomen flavo-olivaceum, aequo guttatum; femora olivacea; alae subtus antice sub-ochraceae, postice olivaceo-fuscae; remiges scapis flavis, 2 exteruae atrae; cauda acuta, rectricibus intermediis nigris, lateralibus olivaceis, nigro-fasciolatis; rostrum breve, nigrum; pedes albescentes. Longitudo corporis 7'; rostri 7".

Habitat in sylvis fl. Amazonum, Pico melanochloro duplo minor, Cayennensis a Lath. et Bus. nominatus (Foem. pl. 615.). Sp. 2.

SPECIES 13. **PICUS RUBRIFRONS.** TAB. I.V. M. 1. Foem. 2.

Minor, violaceo-niger; abdomine purpureo; uropygio albido; crasso, femoribus vexilloque remigum interno albo nigroque fasciolatis; fronte maris purpurea.

DESCRIP^TIO. Corpus Fringilla vix majus, supra et subtus violaceo-nigrum; caput nigrum, fronte maris in medio purpurea; dorsum insimum uropygiumque albida; alae subtus fuscae, antice albo-maculatae; remiges nigræ, vexillo interno medio albo-subfasciato; hypochondria, abdomen laterale crissumque albo-nigroque fasciolata; abdomen intermedium purpureum; cauda alis vix longior, nigra, rigida, acuta, raro albo-guttata; rostrum subarcuatum, nigrum; oculi flavi; pedes nigri, pulverulentii. Longitudo corporis $6\frac{1}{2}'$, caudae $2\frac{1}{2}'$, rostri 1'.

Habitat in sylvis Parae, mas a foemina fronte non nigra sed purpurea, abdomine latius purpureo rostroque breviore diversus; differt a pico hirundinaceo Lath. et Bus. (pl. 694.), cuius specimina 2 in museo monacensi exstant, vertice modo purpureo, stria supra oculos ad occiput albida, occipiteque flavo-aureo. Sp. 3.

SPECIES. 14. **PICUS ICTEROCEPHALUS.** TAB. LIV. M. 1. Foem. 2.

Minor, supra immaculate olivaceo-viridis, subtus olivaceo-virescens, albo nigroque fasciolatus; fronte, periophthalmiis, macula auriculari gulaque foeminac aurcis; occipite gulaque maris purpueis.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine Alaudae; occiput non cristatum, purpureum; synciput, genae, aures, gula collumque flavo-aurca, gula maris purpurea; remiges introrsum et ad basin rufae, primariae apice nigro-fuscae; cauda rigida olivaceo-virescens, apice nigricans; collum inferius, pectus, abdomen, crissum axillaeque olivaceo-viridia, albo nigroque fasciolata, fasciis pectoris foeminae subtriquetris; rostrum breve, nigricans; pedes coeruleo-nigri. Longitudo corporis 7', caudae 2 $\frac{3}{4}$ ', c. alis 1. 1', rostri 9".

Habitat in Sylvis fl. Amazonum, mas a foemina gutture non flavo sed purpureo diversus; differt a Pico Buffonii pl. 784 fronte non purpurea maculisque non omnibus cordatis. Sp. 2.

SPECIES 15. **PICUS MACULIFRONS.** TAB. LVI. Fig. 1.

Minor, supra olivacco-flavescens flavidoque striatus, subtus albido viridique nigro tenuiter fasciolatus; fronte nigra, flavo punctata; occipite purpurascente; nucha flavicante; gutture albido, fusco striato; macula auriculari viridi-grisea.

DESCRIP^TIO. Corpus Fringilla vix majus, supra viridi flavescentes, strigis flavidis adpersum; stria infra aures albicans; guttur sordide albicans, fusco non fasciolatum sed longitudinaliter striatum; alae subtus flavidio-albae; remiges primariae fuscae, vexillo externo fulvo, interno albo subfasciato, secundariae viridi flavescentes, interne nigricantes, albo fasciatae; cauda brevis, rigida, nigricans, medio fulvo fasciata; rostrum, oculi pedesque nigricantes. Longitudo corporis 5 $\frac{3}{4}$ '.

Habitat in sylvis Rio de Janciro et Parae, mas occipite purpurascente a foemina diversus. Sp. 2.



PICUS icterocephalus. 1. *Mas.* 2. *Fem.*

Tab. LIV



PICUS Maculifrons. 2 Ruficeps. Nos. 3 Form



CORACINA ornata

Tab. LIX.

SPECIES 16. PICUS RUFICEPS. TAB. LVI. M. 2. F. oem. 3.

Minor, olivaceo-viridis, subtus fusco-olivaceus, flavo-albo fasciolatus; fasciis fusco-olivaceis, latioribus; gutture non albo striato sed fasciato; capite foeminae fusco-brunneo, praecipue pone fulvo striato, maris purpurascente.

DESCRIP^TIO. Corpus praecedente haud minus, supra olivaceo-viride, strigis non-nullis ferrugineis; vix differt a specie praecedente nisi collaris minus flavescente quam virescente, gutture brunnescente non striato sed fasciato, fronte maris purpurea, strigis supra alas ferrugineis, alis subtus antice fusco fasciatis, fasciis abdominis fusco-olivaceis latioribus, remigum primiarum vexillo externo vix fulvo maculato, rostroque vel cinereo vel nigro.

Habitat in sylvis fl. Amazonum; varietas forsitan Pici Maculifrontis? Sp. 4.

P I C A E.

Frequenter gregariae, audaces, animalibus, vel plerumque fructibus vicitantes, in arboribus et locis altis nidificantes, modo psittacorum gridantes vel vociferantes; corpore gravi; pedibus subelevatis, gressoriis ac saltatoriis, squamoso-fasciatis; digitis robustis, 3 anticis, postico 1, longiusculo, exterioribus anticis pone subconnatis; rostro longo, cultrato, cylindrico-cuneato, haud raro subarcuato; naribus basalibus, oblongis; alis subcruciatis; lingua haud raro apice divisa.

GENUS I. CORACINA.

Corvina; rostro ad basin lateraliter subdepresso, plumis rigidis tecto, subarcuato, apice cylindrico, supra infraque dentato; rictu oris usque infra oculos prolongato; maxilla inferiore pone non elevata; naribus a basi rostri parum remotis.

SPECIES 1. CORACINA ORNATA. TAB. LIX.

Violaceo-nigra; fronte juguloque cristatis; naribus non obtectis.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine Corvi, supra et subtus violaceo-nigrum, periophthalniis nigroplumosis; caput grande, inter nares et frontem cristatum, fasciculo

pilosо-plumoso, subfiliformi, nigro-violaceo, erecto, apice circum deflexo, pluvialis instar supra caput extensili, scapis rigidis albis, ad radicem nudiusculis; jugulum aequе cristatum, infra cristam nudum, crista fasciculosa, fere 2' longa, e jugulo supra pectus dependente, ad radicem nigra, ad apicem latiuscula, truncata, violaceo-chalybea, plumis non filiformibus sed planis; alae subtus cinerascentes; remiges primariae nigro-fuscae, cruciatae; cauda alis longior, subaequalis; rostrum crassum, nigrum, apice convexum, arcuatum, dentatum, basi lateraliter depresso, trigonum, latius, plumulis vibrissisque munitum; oculi virescentes; nares patentes, ovatae, longitudinalis; pedes robusti, cinerei, anulis squamosis fasciati; digiti longi, exterior minus longus, ante basin connatus; unguis digiti medii longioris oblique curvatus. Longitudo corporis 1° 5', caudae 7', c. al. l. 5 $\frac{1}{3}$ ', rostri 2 $\frac{1}{2}$ '.

Habitat gregarie in sylvis ripariis fluminis Solimoëns ad pagum Fonteboa; foemina fasciculo jugulari breviore, frontali ad apicem vix recurvo. Sp. 4.

GENUS II. PRIONITES.

Picae-, vel cueuliformis, brevi volans; rostro cylindrico, capite longiore, subarcuato, ad marginem utrumque serrato, lateraliter ad angulum oris vibrissis munito, apice non dentali; naribus rotundis, patulis; lingua pennacea; digitis 2 exterioribus usque ad medium connatis, interiore breviore; cauda gradato-elongata; alis brevibus; tarsis digito medio longioribus.

SPECIES I. PRIONITES MARTII. TAB. LX.

Castanens; alis caudaque coeruleo-virescentibus; femoribus viridibus; vitta a naribus ad aures; plumulis in collo medio 2 nigris; recticibus intermediis longioribus, angustioribus; digito postico breviusculo.

DESCRIP^TIO. Corpus magitudine Picae, subtus castaneum; caput totum, gula collumque castanea; periophthalmia maculaque ante et infra oculos, praeципue supra aures nigerrima; tectrices dorsi anterioris alarumque humerales rufo-olivaceo virescentes, tectrices dorsi alarumque reliquae virescentes; remiges brevissimae, viridi coeruleo, extus violaceo-marginatae, barba interiore apiceque fuscescentibus; alae subtus cinereo-fuscae; crissum femoraque virescentia; plumulae juguli duae nigrae;



PRIONITES Martii.

Tab. LX.



CASSICUS bifasciatus

Cassique brun à deux bandes au bec.

Tab LXI.

cauda longissima, inaequalis, supra coeruleo-virescens, apice coeruleescens, subtus nigricans, rectricibus intermediis elongatis, minus angustis quam in Prionite brasiliensi ac Cayennensi; rostrum nigrum, apice emarginatum; nares plumis nigris fere tectae; pedes pulverulenti. Longitudo corporis $1^{\circ} 2\frac{1}{2}'$, caudae $9\frac{1}{2}'$, e. alis long. $8'$, rostri $1\frac{3}{4}'$.

Habitat parasiticus sub nomine Jiriba in sylvis Parae, brevi volans et sub terra nidificans; differt a Prionite Dombé Vaill. Nro. 59 ab domine non viridi, a P. Tutu ab domine non coeruleo, a P. brasili. capite supra nec violaceo, nec nigro, nec flavo variegato. Sp. 2:

GENUS III. CASSICUS. (Yapú, Japué Brasil.)

Gregarius, vociferans, nidos ab arboribus altis pendentes construens, insectis, praeceps fructibus citri victans; rostro conico, fere cylindrico, ad basin alto, convexo, fronti intruso, versus apicem tenui, acuto, recto vel raro arcuato, edentato; maxilla inferiore pone elevatiore, angulato-deflexa; naribus subbasalibus, linearibus; pedibus robustis, scutatis; cauda longiuscula, subaequali; lingua apice bifida.

SPECIES I. CASSICUS BIFASCIATUS. TAB. LXI.

Major, castaneus; capite, collo remigumque apice nigris; rostro nigro, rubro bifasciato; crista capitis retrorsum dependente, filiformi; rectricibus exterioribus immaculate luteis.

DESCRITIO. Corpus magnitudine Cornicis, supra subtusque immaculate castaneum, capite, collo, pectore superiore remigumque apice nigris; rostrum nigrum, ad basin altissimum, supra planum, tuberosum, subtus ad angulum oris rubro maculatum, apice rubro-fasciatum; alae subtus nigrae; pennae cristae 2—6 filiformes, e medio vertice longe dependentes, nonnullae latiores et breves; remiges cruciatae, vexillo externo castaneo, interno apiceque nigrescentibus; cauda immaculate citrea, tectricibus supra castaneis, intermediis 2 longitudine fere caudae, nigrescenti-castaneis; pedes oculique nigri. Longitudo corporis $1^{\circ} 5'$, caudae $7\frac{1}{2}'$, e. alis long. $2\frac{3}{4}'$, rostri $5'$.

Habitat in sylvis prope Maranhão et Pará; differt a Cassico Albirostre Vieill., Buff. pl. 344, qui minor totus niger dorsoque insimio, uropygio et criso castaneis rostroque albidissimo est. Sp. 3.

SPECIES 2. CASSICUS ANGUSTIFRONS. TAB. LXII.

Major, subcristatus, virescenti-brunnescens; rostro ad frontem angusto, non tuberoso; cauda flava, ad apicem brunnescente, rectrice intermediis proxima semiflava, ad barbam interiorem subnigra.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine Cornicis, supra subtusque virescenti- vel olivaceo-brunnescens; caput, collum femoraque flavido virescentia; crista frontalis brevis, retroversa, latipennis; macula superauricularis brunnescens; alae subtus virescenti nigrescentes; uropygium crissumque castanea; cauda flava, ad apicem brunnescens, rectricibus intermediis supra nigrescentibus, subtus virescentibus, barba rectricis lateralis mediae externa flava, interna nigrescente, rectrice exteriore ad apicem olivacea; rostrum nigrum, ad apicem frontis angustum, non tuberosum; oculi coerulei. An varietas juvenilis speciei praecedentis?

Habitat in confinibus fl. Amazonum; differt a Cas. cristato Lath. sive viridi Buff. pl. 328, qui rostrum flavidum, ad apicem frontis tuberosum, latum et plenum, corpus anticum olivaceo-viride, hypochondria, femora, crissum uropygiumque lacte castanea habet. Sp. 3.

SPECIES 3. CASSICUS NIGERRIMUS. TAB. LXIII. FIG. 1.

Minor, niger absque violaceo; rostro recto, albo, ad frontem convexiusculo.

DESCRIP^TIO. Corpus Oriolo nigro Lath. fere duplo minus, nigrum; caput, collum, pectus, dorsum tectricesque alarum nigerrima absque splendore violaceo; remiges, nec non cauda fusco-nigrac; rostrum album, cuneatum, rectum, ad frontem convexum; pedes nigrantes. Longitudo corporis $8\frac{1}{2}'$ caudae $4\frac{1}{3}'$, c. alis $1.2\frac{1}{2}'$, rostri $1\frac{1}{3}'$.

Habitat ad ripam fl. Amazonum; differt ab Oriolo nigro corpore duplo fere minore, non violaceo relucente, rostro non nigrō, breviori, non arcuato, ad frontem non plano nec latiore. Sp. 1.



CASSICUS angustifrons

Tab. LXII



CASSICUS nigerrimus

2.
ICTERUS minor.

Tab. LXIII.



Corvus tanagrinus. 2. sulcirostris.

Tab. LXIV

GENUS IV. I C T E R U S.

Diversus a Cassico rostro modo subarcuato, breviori, ad frontem angustissimo.

SPECIES 1. ICTERUS MINOR. TAB. LXIII. Fig. 2.

Minor, nigro-violaceo pulcherrime splendens; tectricibus alarum caudaque supra chalybeis; rostro ad angulum maxillae deflexo.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine Alaudae, supra et subtus nigro-violaceo splendens; alae supra caudaque chalybeo-relucentes; remiges nigrae; rostrum nigrum, breve, subarcuatum, ad frontem planiusculum; maxilla inferior postice elevata, angulato-deflexa; oculi pedesque nigri; pedes tenues, nigricantes. Longitudo corporis $7\frac{1}{3}'$, caudae $5\frac{1}{3}'$, c. alis l. $1'$, rostri $7''$.

Habitat gregarius vociferansque in campis fl. St. Francisci, boves mulosque concomitans; mas a foemina non, a figura Buff. pl. 606 maxime diversus (Azar. Nro. 61) Sp. 6.

SPECIES 2. ICTERUS SULCIROSTRIS. TAB. LXIV. Fig. 2.

Mediocris, haud violaceo-niger; plumis capitis filiformibus, sturninis; rostro subarcuato, elevato, lateraliter rugoso-sulcato.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine Merulacae, supra et subtus splendide nigrum, vix violaceum; plumae capitis, nec non colli filiformes, sturninae, postice defluentes, nigerrime splendentes; periophthalmia nudiuscula; tectrices alarum squamoso-nigrae; semina et remiges raro atro-fusca; rostrum nigrum, crassum, lateraliter rugoso-sulcatum; maxilla inferior pone elevata, deflexa; pedes validiores, nigri. Longitudo corporis $9'$, caudae $4'$, c. alis l. $1\frac{3}{4}'$, rostri $11''$.

Habitat in campis Minas Geraës. Sp. 3.

SPECIES 5. ICTERUS TANAGRINUS. TAB. LXIV. Fig. 1.

Minimus, nigerrimus absque splendore; rostro brevi, tenui, ad frontem tenerrimo; maxilla inferiore pone neque angulato-elevata, neque deflexa; cauda longiuscula.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine Alaudae, supra subtusque totum nigerrimum, absque splendore violaceo; alae breviores; cauda longiuscula; rostrum nigrum, breve,

tenue praeceps ad frontem. Longitudo corporis $7\frac{1}{2}'$, caudae 4', c. alis long. $2\frac{1}{3}'$, rostri 7".

Habitat sub nomine Ouampé in locis sylvaticis Paraë, ab Ict. minore splendore non violaceo, rostro tenui maxillaque inferiore pone nec elevata nec deflexa diversus. Sp. 5.

SPECIES 4. ICTERUS FRINGILLARIUS. TAB. LXV. M. 1. Fœm. 2,

Minimus, cano-virescens; remigibus secundariis ferrugineis; macula superauriculari nigrante.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine coloreque Fringillæ, subtus pallide rufescens, foeminae canescens; caput maris fusco-brunnescens; stria pone oculos clarior maculaque supra aures subnigrae; dorsum maris fusco-brunneum, foeminae canescenti-brunneum; tectrices alarum humerales et scapulares fuscae, rufo-marginatae, axillares remigesque secundariae rufae, barba interna apiceque nigrescentibus; cauda nigricans, recticibus, praeceps externis ruso marginatis; rostrum nigrum, minus crassum quam in Ict. minore; maxilla inferior pone subelevata ac deflexa; oculi pedesque nigricantes. Longitudo corporis 6', caudae $2\frac{1}{2}'$ c. alis l. $1\frac{1}{2}'$, rostri 7".

Habitat in campis Minas Geraës Icterorum minorum cohortes concomitans et a nonnullis eorum foemina falso forsitan, uti et Azara p. 172 affirmat, judicatus; foemina differt a mare corpore subtus, dorso caudaque subtus magis canis, alisque paleo rufis. Sp. 2.

SPECIES 5. ICTERUS CHRYSOCEPHALUS. TAB. LXVII. Fig. 1.

Minor, niger; rostro subtenui, arcuato; capite supra toto, humeris, uropygio femoribusque luteis; cauda rigida.

DESCRIP^TIO. Corpus praecedente vix majus, supra subtusque nigrum; caput, nucha, tectrices humeri supra et subtus, uropygium, femora nec non crissum lutea; capistrum, periophthalmia, genae, aures gulaque nigerrima; rostrum nigrum, subtenui, arcuatum, cylindricum, versus frontem acutiusculum; nares longitudinales; maxilla inferior pone nec elevata nec deflexa; cauda uti in picis rigida; pedes coeruleo-cinerascentes. Longitudo corporis $7\frac{1}{2}'$, caudae $5\frac{1}{3}'$, c. alis l. 2", rostri 10".





ICTERUS citrinus.

Tab. LXVI.



ICTERUS chrysocephalus. TURDUS flavipes

Tab. LXVII

Habitat solitarius in sylvis ripariis fl. Negro, cantu melodico fere uti philomela europaea insignis et ab incolis sic dictus; differt ab Ictero Cayennensi Buff. p. 555 capite, uropygio, crasso femoribusque non nigris. Sp. 1.

SPECIES 6. ICTERUS GITRINUS. TAB. LXVI.

Niger; capite, collo, humeris, corpore subtus citrinis; cauda, dorso alisque immaculate-nigris.

D E S C R I P T I O. Corpus magnitudine Merulae, supra immaculate nigrum, subtus subaurantio-citrinum; caput, collum erissumque tota citrina; periophthalmia genaeque nuda, nigra; humeri supra subtusque citrini; dorsum, alae et cauda supra subtusque immaculate nigerrima; rostrum nigrum, subarcuatum, pone crassum, ad angulum maxillae angulato-deflexum; pedes elevati, nigri. Longitudo corporis $9\frac{1}{3}$ ', caudae $5\frac{1}{2}$, c. alis l. $2\frac{1}{2}$, rostri $1\frac{3}{4}$ '.

Habitat supra arbusta ad ripam fluminis Solimoëns. Sp. 1.

T U R D I.

In migratione modo familiares, frequenter canori, vermi-, vel insectivori vel baccivori; haud raro in terra ad cibum quaerendum ambulantes vel saltantes; rostro tenui, subulato, ad basin vix largiusculo, in frontem tenerrime intrante, ad apicem subarcuato, haud raro emarginato vel denticulato; naribus basalibus, lateralibus, subrotundis; tarsis non crassis, digitis longioribus, scutellatis; digitis 3 anticis, postico reliquis breviore, lateralibus subaequalibus, externo ad basin modo subconnato; cauda subacquali.

GENUS I. TURDUS: (Savia Brasil.)

Rostro capite non longiore, ad basin largiusculo, ad apicem denticulato; naribus membrana larga obiectis; vibrissis nonnullis malaribus nec non gularibus; rictu oris ab oculis remoto.

SPECIES 1. TURDUS FLAVIPES. TAB. LXVII. Fig. 2.

Niger; dorso, humeris abdomineque plumbeo-cinereis; rostro, palpebris pedibusque flavis.

D E S C R I P T I O. Corpus Merula minus, caput, collum, pectus, alae, femora caudaque nigra; dorsum, uropygium, tectrices humerales, abdomen, hypochondria erissumque plumbeo-cinerea; alae subtus cinereo-nigrae; rostrum breve, flavum, basi lar-

giusculum, apice dentatum; palpebrae pedesque flavi; oculi rubro-brunnei. Longitudo corporis $7\frac{1}{2}'$, caudae $3\frac{1}{3}'$, c. alis l. 2', rostri 9".

Habitat Sabia-Uua nominatus in sylvis Rio de Janeiro et eantii insignis; mas a foemina gula striaque dorsi medii subalbescens diversus. Sp. 2.

SPECIES 2. TURDUS RUFVENTER. TAB. LXVIII.

Cinereo-olivaceus supra; gula albida pectoreque cinereo-fusco strigilatis; humeris subtus, abdomine, femoribus crisoque rufis,

DESCRIP^TO. Corpus magnitudine Turdi pilaris, supra olivaceo-cinereum vel fuscum; gula albescens, fusco strigilata; pectus cinerascens, plumis medio fusco-strigilatis; cauda longiuscula, aequalis, supra olivaceo-fusca, subtus cinerascens; rostrum fuscescens, apice subflavicans, denticulatum; pedes fusco-flavidi; palpebrae flavidae; oculi brunnei. Longitudo corporis $9\frac{3}{4}'$.

Habitat sub nomine Sabiá da Praya in confiibus Rio de Janeiro (Azar. Nro. 79.). Sp. 2.

SPECIES 3. TURDUS ALBIVENTER. TAB. LXIX. M. 1. F. 2.

Olivaceo-brunnescens vel cinerascens; gula albida, fusco-striata; macula supra aures brunneo-grisea; pectore cinereo, immaculato; abdomine crisoque obscure albidis; alis subtus rufis; femoribus albidis.

DESCRIP^TO. Corpus magnitudine T. Rufiventris, a quo differre videtur striis guiae largioribus, macula auriculari albo-striata, pectore non striato, abdomine crisoque nequaquam rufis. Mas corpore supra magis rufo-brunneo, subtus brunnescenti-albo, foemina magis alivaceo-cinereo, subtus albidiore gaudet; juvenis supra brunneo-rufus plumis medio ruso-strigilatis, tectricibus alarum ruso-maculatis, corporeque subtus brunneo-vel ciuereo-rufescente fulvoque strigilato est.

Habitat in provincia Minas Geraës et Parae (Azara Nro. 79?). Sp. 7.



TURDUS Rufiventer

Tab LXVIII



TURDUS Albiventer 1. Mas. 2. Fem.

Tab. LXIX.



TURDUS albicollis

Tab. LXX.



TURDUS Orpheus 1. Mas. 2. Form.

Tab. LXXI

SPECIES 4. TURDUS ALBICOLLIS. TAB. LXX.

Brunneo-rufus supra, subtus ad abdomen medium albescens, lateraliter rufescens; jugulo crissoque albidissimis; gula large fusco-striata; capite caudaque cinerascentibus; pectore rufescenti-cinereo; hypochondriis abdomineque interfemorali rufis.

DESCRIPTION. Corpus praecedente vix magus, supra brunneo-rufum; caput cinereo-olivaceum; macula auricularis fusca; gula albida, nigro-fusco large striata; vexillum remigum externum olivaceum, internum nigricans, basi fulvo-marginatum; femora fusca; humeri subtus ferruginei; rostrum, oculi pedesque brunneo-fusci. An T. Crotopezus Lichtenst.? Longitudo corporis $8\frac{3}{4}'$, caudae $3\frac{1}{2}'$.

Habitat in provincia Bahiae. Sp. 1.

SPECIES 5. TURDUS ORPHEUS. TAB. LXXI. M. 1. F. 2.

Rufescens vel cinerascens supra, subtus fulvo-albescens, mas subius fusco-maculatus; stria supra oculos albida, alia pone aures nigricante; rectricibus alarum ferrugineo vel albo-, remigibus albo-marginalis; rectricibus longiusculis, cinereis vel cinereo-fuscis, lateralibus ad apicem albis.

DESCRIPTION. Corpus magnitudine Turdi pilaris, foeminae supra fusco-cinerascens, rectricibus alarum remigibusque albo-marginatis, subtus magis sordide immaculataque albescens, hypochondriis fusco parum striatis, maris supra fusco rufescens, rectricibus alarum ruso-marginatis vel maculatis, remigibus fusco-nigricantibus, undique albo marginatis, subtus albicans, nigricanti-striatum sive submaculatum; vitta alba a naribus supra oculos, foeminae largior; alae subtus ad basin axillaeque albantes; cauda longiuscula, cinerea vel fusco-cinerea rectricibus intermediis totis fuscis, lateralium apice large albo, exterioris apice reliquis extensus albo, barba externa aequa alba; rostrum nigricans, praecipue foeminae subarcuatum, ad apicem plus minusve denticulatum, ad basin setis migris munitum; pedes longiusculi, nigricantes; oculi flavi. Longitudo corporis 10', caudae 5', c. alis l. $5\frac{1}{2}'$, rostri 1'.

Habitat sub nomine „Sabia branca, vel do Campo“ supra arbusta prope Joazeiro ad flumen St. Francisci; specimen e provincia Rio de Janeiro allatum Turdo plumbeo Lath., Buf. pl. 560 fere simile ab Orpheo differt capite submaculato dorsoque canesceni-cinereis, abdomine toto albo, hypochondriis fusco striatis, cauda fere nigra rectricibus exterioribus ad apicem vix albis (An idem cum Turdo livido Lichtenst.?); differt a turdo Buff. pl. 558 alis medio caudaque subtus tota non albis. Spec. 7.

GENUS II. MYOTTERA.

Brachyptera, myrmecophaga; tarsis elevatioribus; rostro brevi, plus vel minus crassiusculo, rectiusculo, ad apicem subcylindrico, subemarginato; naribus oblongis, membrana parum subtectis; alis brevibus; cauda plus minusve abbreviata, acquali.

SPECIES 1. MYOTIERA RUFICEPS. TAB. LXXII. Fig. 1.

Viridi-olivacea supra, subtus nigricans; capite supra rufa; remigibus subrufescens; cauda nigricante, axillis fulvis; ungue digiti postici fere recto.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine Alaudae, supra immaculate viridescens olivaceum; caput supra ferrugineum, lateraliter fulvescens, plumulis ad basin nigris; genae, lora, gula, collum laterale pectusque nigra; nucha subochracea; abdomen, hypochondria, femora crissumque nigro-cinerea; alae subtus antice nigræ albæque, medio fulvae, postice cinerascentes; tectrix 1 superaxillaris fulva; remiges rufo-brunneæ; cauda nigricans; rostrum nigrum, non altum, apice dentatum; pedes flavicantes; unguis digiti postici fere rectus. Longitudo corporis $6\frac{3}{4}$ ', caudæ 2', c. al. l. $1\frac{1}{2}$ ', rostri $1\frac{1}{2}$ ", tarsi $1\frac{1}{3}$ '.


Differt colore gulæ corporisque totius a Turdo Colma Lath.; Buff. pl. 705, minus a Tétema a Lathamio cum Colma unito et a Buffoni male figurata pl. 821. Sp. 1.

SPECIES 2. MYOTIERA LEUCONOTA. TAB. LXXII. Fig. 2.

Castaneo-brunnescens supra, subtus rufescens; dorso anteriore medio albo; cauda genisque nigris.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine Motacillæ albæ, supra brunneo-castaneum, plumis ad basin cinereo-nigris, in dorso longiusculis, intumidis; macula dorsi anterioris alba, larga, plumis ad basin albis; genae nigra-setaceæ; gula albicans; collum subtus, pectus abdomen femoraque fulvo rufescens; crissum nigricans; cauda immaculate nigricans; alae subtus antice subrufescentes, postice cinereæ; rostrum supra fuscum, subtus flavicans; pedes rufo-fusci; unguis digiti postici curvus; oculi rubri. Longitudo corporis $6\frac{1}{2}$ ', caudæ $2\frac{1}{2}$ ', c. al. l. 2', tarsi $1\frac{1}{3}$ ', rostri $10''$.

Habitat in consimilibus Paræ, primo intuitu Turdo Brasilensi, pratensi et atricapillo a Lathamio falso seu à speciebus diversis descriptis similis; differt vero ab illis magnitudine, structura, nec non dorso albo.



MYIOTHERA *ruficeps* & *leuconota*

Tab. LXXII



1.

2.

PHILYDOR superciliaris. MYOCHERA Coraya.

Tab. LXXIII

SPECIES 3. MYOTHERA CORAYA. TAB. LXXIII. Fig. 2.

Castanea, subtus sordide albescens; capite fusco-olivaceo; stria supra oculos gulaque albis; macula auriculari nigricante, albo-striata; cauda nigro ferrugineoque fasciolata.

DESCRIP^TIO. Corpus specie praecedente duplo minus; caput olivaceo-cinereum; stria a naribus supra oculos alba; macula superauricularis cinerea, albo-striata, infra albo-maculata; gula alba, lateraliter nigro-lineata; dorsum rufescens; alae subtus antice ochraceae; remiges fuscae, vexillo extero rufescente; pectus cinereo-albescens; abdomen albo-rufescens; hypochoudria rufescens; crissum rufo nigroque fasciatum; cauda pallide rufo nigroque 14 fasciata; rostrum nigrum, breve, subarcuatum; pedes nigrescentes; oculi grisei. Longitudo corporis $5\frac{1}{2}$, caudae $2\frac{1}{4}$, c. alis 1. $1\frac{1}{3}$. rostri 9".

Habitat in Provincia Bahiae. Sp. 2.

GENUS III. PHILYDOR.

Insectivorus, ad ripam aquarum solitarie ambulans; cauda longiuscula, inaequali, Dendrococaptum modo sed molli; erista capitidis brevi, plieatili; rostro subulato, lateraliter subcompresso, ad apicem subcylindrico, subdecliui, subaduncu, emarginato; maxilla inferiore breviora quam superiore; naribus subbasalibus, rotundis, minutis; rictu oris usque infra oculos elongato; tarsis breviusculis.

SPECIES 1. PHILYDOR SUPERCILIARIS. TAB. LXXIII. Fig. 1.

Rufus supra subtusque; capite nigro; periophthalmiis albis; cauda ferruginea; striga malari et postoculari nigris, 2 lateralibus ferrugineis; remigibus fuscis.

DESCRIP^TIO. Corpus Fringilla domestica minius, supra rufescens, subtus rufum; caput supra nigrum; gula, stria pone oculos ad occiput aliaque infra aures ferruginea; striga malaris aliaque supra aures nigrae; gula collumque totum, nec non pectus, abdomen, femora, uropygium crissumque laete ferruginea; tectrices alarum fuscae, rufo-terminatae; remigum vexillum exteriis rufo-brunneum, interius et ad apicem nigrum, secundiarum introrsum fulvo-marginatum; alae subtus antice ferrugineae, medio fulvae, antice nigricantes; cauda Dendrococaptum modo sed mollis, longius-

cula, cuneata, inaequalis, supra et subtus castaneo-rufa; rostrum breve, nigrum, subulatum, lateraliter compressum; pedes albi; oculi nigri. Longitudo corporis 6', caudae $2\frac{1}{2}'$, c. alis l. 2', tarsi 9", rostri 7".

Habitat in provincia Minas Geraes; mas differt a foemina rostro acutiore, ad apicem dentato, dorso fusco-ruso. Sp. 2.

SPECIES 2. PHILYDOR ALBOGULARIS. TAB. LXXIV. Mas. 1. F. 2.

Ruso-castaneus supra, subtus rufescens; capite maculaque superauriculari obscure strigilatis; gula colloque laterali albis; cauda laete rufa.

DESCRIP^TIO. Corpus Lanio Excubitore vix minus, supra rufum, subtus fulvum, plumis capitis plicatibus; gula, jugulum, collum anticum, nec non pectus anterius flavido-alba; pectus inferius abdomenque dilute rufescens; femora crissumque rufa; remiges alarum fuscae, ad basin ochraceae, vexillo externo ruso; humeri subtus ferruginei; cauda longiuscula, ruso-ferruginea; rostrum supra fuscescens, subtus flavigans; pedes cinerascentes. Longitudo corporis $7\frac{1}{4}'$, caudae $3\frac{1}{3}'$, c. alis l. 2', rostri 1'.

Habitat ad ripam fluminis Verde; foemina differt a mare corpore supra brunnescente, subtus fulvo-cimerascente, rostro nonnihil breviore. Sp. 3.

SPECIES 3. PHILYDOR RUFICOLLIS. TAB. LXXV.

Olivaceo-rufescens supra, subtus laete rufus; capite ciuereo-nigro; fronte, gula, sibia super oculos, periophthalmis maculaque auriculari ferrugineis.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine praecedentis; caput ciuereo-nigrum; frons, stria super oculos, genae, periophthalmia, macula auricularis, gula, collum subtus, pectus, abdomen crissumque lacte ferruginea; dorsum nec non hypochondria uropygiumque ruso-olivacea; alae rufae, subtus laete ferrugineae, remigibus apice et intus fuscis; cauda ferruginea, ad basin subolivacea, rectricibus intermediis reliquis sublongioribus; rostrum subdentatum, nigricans, subtus medio flavigans; pedes fusi. Longitudo corporis $7\frac{1}{2}'$, caudae $3\frac{1}{2}'$, c. alis l. 2', rostri 10".

Habitat in interiore Bahiae; mas a foemina non diversus. Sp. 2.



PHILYDOR *albogularis*. 1 ♂ 2 ♂

Tab. LXXIV.



PHILYDOR *ruficollis*

Tab. LXXV.



ANTHUS / brevirostris, Chii

Tab LXXVI .VII.

GENUS IV. ANTHUS.

Palustris, in altum non volans; rostro graeili, ad basin subdepresso, versus apicem tenui, subulato, subcompresso, leviter emarginato, marginibus introrsum versis; naribus basalibus, oblongis, vix tectis.

SPECIES 1. ALAUDA (ANTHUS) CHI.

TAB. LXXVI. Fig. 2.

Nigricans fulvoque maculata supra, subtus fulvo-albicans; pectore fusco-striato; rectricibus 2 externis albidis; ungue digiti postici longiore, vix curvo.

DESCRIP^TIO. Corpus Antho pratensi subminus, gracile, supra nigrum, plumis fulvo-striatis, tectricibus alarum remigibusque fulvido-marginatis; gula abdomenque sordide alba; pectus albidum, nigro-fusco striatum; alae subtus albicantes; cauda fusco-nigra, rectricibus intermediis fere brevioribus, rectrice externa alba, laterali aequa alba, barba interna nigricante; rostrum fuscescens, basi depresso-unculum, subtus pedesque flavicantes; unguis digiti postici linearis, digitis longior, fere rectus: Longitudo corporis $4\frac{3}{4}'$, caudae 2', c. alis l. $1\frac{1}{3}'$.

Habitat in pratis sylvestribus Rio St. Francisci. Sp. 2.

SPECIES 2. ALAUDA (ANTHUS) BREVIUNGUIS.

TAB. LXXVI. Fig. 1.

Nigro-virescens supra, subtus viridi-albicans; striis alarum 2 transversis albis; ungue digiti postici brevi, curvato.

DESCRIP^TIO. Corpus praecedente vix majus; caput dorsumque fusca, flavescenti virescentia; gula, pectus axillaceque albescentia, fusco-strigilata; abdomen crissumque fulvo-albida, plumis ad basin nigris; tectrices alarum virescenti-fuscae, mediae albo-marginatae vel transverse albo-bistriatae; remiges fusco-nigrae, margine externo albo-virescenti; alae subtus sordide albae; canda brevis, nigricans, rectricibus 2 externis introrsum albo-maculatis; rostrum fuscum, flavo-marginatum; pedes flavicantes; unguis, nec non posticus, breves, curvi.

Habitat in provincia Para. Sp. 1.

GENUS V. FIGULUS.

Ad marginem aquarum ac sylvarum solitarie et quasi domestice ambulans, nidum forniciis instar e limo supra arbores non altas inter ramos construens; cauda aequali breviuscula; rostro longiusculo, subulato, ad apicem subarcuato, non emarginato; rictu oris usque infra oculos fere prolongato, subarcuato; naribus subbasalibus, ovatis, vix tectis.

SPECIES. 1. FIGULUS ALBOGULARIS. TAB. LXXXVIII. M. 1. F. 2.

Cinnamomeus supra, subtus ochraceo-rufus; gula crisoque albis; striga a genis supra oculos versus occiput albo-ochracea; cauda rufa; vibrissis brevibus.


DESCRIP^TIO. Corpus Alauda arvensi majus, supra cinnamomeum, maris subtus ferrugineum, foeminae albo-ochraceum; caput fuscescens, non cristatum, supra oculos ochraceo substriatum; fasciculus auricularis pallide cinnamomeus, intumidus; gula albissima; remiges primariae fuscae, ad marginem externum secundariaeque cinnamomeae ad internum fulvescentes; alae axillaeque subtus fulvescentes; femora cinnamomea; cauda aequalis, rufa; rostrum longiusculum, subtenuè, lateraliter versus apicem subcompressum, rufescens; pedes nigri. Longitudo corporis 7', caudae 2 $\frac{3}{4}$ ', e. alis l. 1 $\frac{3}{4}$ ', rostri 1' 1", tarsi 1 $\frac{1}{3}$ '.

Habitat sub nomine „Joaõ de Barros“ in campis provinciae Minas Geraës ad flumen Verdes; mas foemina vix minor corpore praecipue subtus brunneo, foemina pallide cinnamomea; nidum e limo, forniciis instar, 7' altum, antrorum apertum et intus pariete divisum inter ramos supra arbores non altas aedificat. Sp. 2.



FIGULUS albogularis. 1. *Mas.* 2. *Fem.*

Tab. LXXVIII



KAMPYLORHYNCHUS . scolopaceus. 2 striolatus .

Tab. LXXIX .

C e r t h i a e.

Plus minusve tenuirostres, mellisugae vel potius insectivorae, non scansoriae, brevi volantes; digitis 3 anticis, 1 postico, lateralibus subaequalibus; rostro tenui, cylindrico, ad basin planiusculo, plus minusve arcuato, ad apicem non emarginato.

GENUS I. CAMPYLORHYNCHIUS.

Turdinus; rostro longiusculo, arcuato, crassiusculo, ad basin latiusculo, versus apicem cylindrico; naribus ovatis, subbasalibus, non obtectis; digito postico reliquis crassiore; alis breviuseulis; rictu oris usque ad oculos elongato.

SPECIES 1. CAMPYLORHYNCHIUS SCOLOPACEUS.

TAB. LXXIX. Fig. 1.

Supra nigro-fuscus, subtus albus, nigro-fusco maculatus; stria super oculos maculaque auriculari albis; cauda longiuscula.

DESCRIP^TIO. Corpus Merula duplo minus, supra plumbescenti-nigricans, plumis hinc inde fulvido-marginatis, subtus album, nigro-fusco maculatum; gula et pectus intermedium alba; pectus laterale nigro-fusco maculatum; abdomen, femora crissumque albo nigroque fusco fasciata; remiges caudaque immaculatae, fusco-nigræ; rostrum illi Paradiseæ Upupaeque simile, supra nigricans, subtus albicans, apice subemarginatum; pedes subvalidi, nigro-albi. Fœm. Longitudo corporis 7', caudæ 5½', c. alis l. 2', rostri 1', tarsi 11".

Habitat in sylvis Rio de Janeiro. Sp. 1.

SPECIES 2. CAMPYLORHYNCHIUS STRIOLATUS.

TAB. LXXX. Fig. 2.

Rufescens supra subtusque; stria supra oculos, gula abdomineque medio albidis; cauda breviuscula aliisque nigro 12 fasciatis; macula auriculari grisea.

DESCRIP^TIO. Corpus præcedente parum minus, supra rufum; caput cinerascenti-rufum; stria supra oculos alba, aliaque post oculos brunnea; tectrices humerales im-

maculate rufae, reliquae vexillumque remigum externum rufa, nigro fasciata, internum nigricans, fulvo marginatum, ad apicem nigricans; alae subtus fulvae; gula alba; pectus pallide ferrugineum; abdomen intermedium rufo-albicans, posterius, hypochondria, femora crissumque castanea; cauda rufo-castanea, nigro 12 fasciolata; rostrum subvalidum, ad basin triquetrum, supra cinerascens, subtus albicans; pedes albidi. Longitudo corporis $4\frac{1}{2}'$, caudae $2\frac{1}{4}'$, c. alis l. $1\frac{1}{2}'$, rostri $1', 2''$, tarsi $1'$.

Habitat in provincia Bahiae. Sp. 1.

GENUS II. TROCHYLYS. (Beija-Flor Brasil.)

Taciturnus, agilis, praeceps ac suspensus breviterque apum instar super flores volitans, melisugus, vel potius insectivorus, zinzilulans; tarsis digitisque gracillimis, brevibus; digitis gressoriis, 3 anticus, 1 postico; alis longiusculis, falcatis; cauda frequenter abbreviata et aequali; mandibulis longitudinaliter absque angulo subcoalitis; lingua jaculatoria, c 2 filamentis versus apicem liberis coalita; rostro tenerissimo, subcylindrico, ad frontem planiusculo, subarcuato, ante apicem intumescente lateraliterque hiante (tenuirostris, rostro subarcuato).

SPECIES 1. TROCHYLYS PYGMAEUS. TAB. LXXX. Fig. 1.

Minimus; rostro longiore, arcuato; capite dorsoque viridi-aureis; alis caudaque fuscis; uropygio corporeque toto subtus rufescens; macula auriculari pectoralique nigrescentibus; cauda alis longiore.

DESCRIP^TIO. Corpus minimum, subtus rufescens; stria postocularis fulvescens, auricularis nigrescens; malae gulaque albescentes; macula pectoris intermedia striaque versus hypochondria et crissum nigra; crissum albescens; remiges violaceo-fuscae; cauda alis longior, fuscocupreo-aurea, ad apicem rufescens, scapis rufis; rostrum longiusculum, nigrum, maxilla inferiore ad basin nigra. Longitudo corporis $2\frac{1}{2}'$, caudae $1'$, c. alis l. $\frac{1}{2}'$, rostri $11''$. Sp. 1.

Figura 1 nidum colibrinum e lana Gossypii fabricatum, cum 2 ovis in campus Minas Geraes repertum exhibit.



1. GRYPTUS ruficollis.

2. TROCHILUS Brevicauda.

3. TROCHILUS Pygmaeus.

Le Beccochiu à gorge rouge. Oiseau mouche à queue courte.

Le Mignon

SPECIES 2. TROCHILUS BREVICAUDA. TAB. LXXX. Fig. 2.

Minor, supra viridi-aurens; rostro brevi, subarcuato; stria postoculari, gula collarique pectorali albidis; pectore ab domine que rufescens; cauda alis aequali.

DESCRIP^TIO. Corpus praecedende vix majus, crassius licet, supra totum, nec nou ad latera colli et super aures viridi-aureo relucens, ab domine medio et circa anum albicante, lateraliter rufescente; crissum rufescens; tectrices alarum humerales viridi-aureae; remiges subviolaceo-atrae; cauda brevis, alas vix superans, supra viridi-aurea, ad apicem rufescens, subtus nigricans; rostrum nigrum, breve, subarcuatum, ad basin latiusculum. Longitudo corporis $2\frac{1}{2}'$, caudae 10'', rostri 6''. Sp. 1.

GENUS III. G R Y P U S.

Majus; rostro trigono, rectiusculo, versus apicem lateraliter serrato, compresso, ad apicem adunco, maxilla inferiore ad apicem ascendentem; cauda latiuscula, aequali, non elongata.

SPECIES 1. GRYPUS RUFICOLLIS. TAB. LXXX. Fig. 3.

Majuscus, supra virescenti-aeneo relucens, subtus cinereo-brunnescens; stria postoculari versus occiput albicante, aliaque inferiore latiore, fusa; collo antico rufo; gula pectore que nigro striatis; cauda violaceo-chalybea.

DESCRIP^TIO. Corpus robustius, supra cupreо-viridi relucens; remiges longae, fusco-subchalybeae; tectrices humerales dorsales et uropygiales obscure virides, aeneo-reflectentes, pluinalis fusco-, humeralibus fulvo-marginatis; abdomen laterale fusco-substrigatum, intermedium fulvescens; crissum rufescens, medio nigro-strigatum; cauda subviolaceo ac tombaceo relucens, ad basin nigricans, alis sublongior, rectrice 1 exteriore media rufa, 2 subsequentibus ad apicem modo rufescens; rostrum longitudine fere alarum, nigrum, acute trigonum, rectum, versus apicem tenerime denticulatum, apice adunco, maxilla inferiore postice subtus albicante. Longitudo corporis 5', caudae $1\frac{3}{4}'$, c. alis l. 4'', rostri $1\frac{3}{4}'$.

Habitat in sylvis Rio de Janeiro; foemina gula media longitudinaliter nigro-striata. Sp. 2.

GENUS IV. COLIBRI.

Rostro rectiusculo, versus apicem intumido, subhiant, maxilla inferiore ad apicem sub-aseendente.

SPECIES 1. COLIBRI CRISPUS. TAB. LXXXI. Fig. 1.

Majusculus, supra viridi-aureo-, subius splendidissime violaceo-viridi relucens; fasciculo parotideo intumido, cupreo-chalybeo; crisso albissimo.

DESCRIP^TIO. Corpus subrobustum supra aureo-virescens, subtus violaceo-viridi smaragdi instar resplendens; remiges fuscae, longae, falciformes; cauda viridi-aurea, aequalis, alas hand exsuperans; rostrum nigrum, capite longius, ad apicem obliquum. Longitudo corporis $4\frac{1}{3}'$, caudae $1\frac{1}{2}'$, c. alis l. 2'', rostri 10''.

Habitat in sylvis Rio de Janeiro, a cel. Temminkio Trochilus Petasophorus nominatus.

SPECIES 2. COLIBRI HIRUNDINACEUS. TAB. LXXXI. Fig. 2.

Viridis, subtus smaragdino relucens; canda longa, filiformi, subius fascia que dorsi inferioris albis; pectori nigrescente; abdomine fuscescente, amice et postice albo-fasciato; rostro capite vix longiore.

DESCRIP^TIO. Corpus haud robustum, cauda gradata, longa, filiformis, supra cinerea, subtus alba, collumque anticum smaragdino resplendentia; remiges fuscae, breviores; rectrices intermediae nigrae, breves, acutae, exteriores elongatae; rostrum nigrum, breve, apice subintumescens. Longitudo corporis $4\frac{1}{2}'$ caudae $2\frac{3}{4}'$, c. alis l. 2', rostri 6''.

Difserit a Colibri (Temmink. pl. 66, fig. 1) fascia pectorali purpurea nulla, ab domine non albissimo. Sp. 1.



1. COLIBRI crispus.

Colibri à épaulettes dorées

2. COLIBRI hirundinaceus.

Colibri vert à queue fourchue.

3. COLIBRI leucopygius.

Colibri noir à queue blanche.



1. COLIBRI albogularis.

Colibri vert à gorge blanche. *Colibri* huppe à operons courts au cou.

2. COLIBRI Helios.

Colibri huppe à operons courts au cou.

3. COLIBRI mystax.

Colibri à moustache allongée.

SPECIES 3. COLIBRI LEUCOPYGUS. TAB. LXXXI. Fig. 3.

Majusculus, niger; cauda alba, aequali, non elongata; alis longioribus.

DESCRIP^TIO. Corpus subrobustum, supra et subtus nigrum; remiges fuscae, cauda longiores; canda latiuscula, tota alba, ad apicem nigro marginata, rectricibus 2 intermediis violaceo-nigris; rostrum nigrum, capite sublongius, rectiusculum, ad apicem subintumescens. Longitudo corporis $4\frac{1}{2}$ ', caudae $1\frac{1}{2}$ ', c. alis brevioris 6'', rostri 10''. Sp. 1.

SPECIES 4. COLIBRI ALBOGULARIS. TAB. LXXXII. F. 1.

Aureo-virescens supra et subius; jugulo immaculate albo; rectricibus caudae externis violaceis, ad apicem albis, intermediis viridi-aureis.

DESCRIP^TIO. Corpus subrobustum, viridi-relucens; gula albo viridique variegata; abdomen intermedium crissumque sordide alba, nigro submaculata; remiges fuscae, cauda aequali fere longiores; rostrum capite duplo longius, supra et ad apicem nigrum, subtus albicans. Longitudo corporis $3\frac{3}{4}$ ', caudae $1\frac{1}{3}$ ', c. alis brevioris 2'', rostri 15''

Habitat in campis Minas Geraës. Figura 1 nidum e lana inter ramos Rhexiae exstructum exhibit.

SPECIES 5. COLIBRI HELIOS. TAB. LXXXII. Fig. 2.

Minor, supra et subtus viridi-aureus; crista verticis rufa, $\frac{1}{2}$ ' longa, erecta; fronte juguloque smaragdino-relucenibus; fasciculo colli lateraliter $\frac{1}{2}$ ' prominente, aequali, lato, medio albo, ad basin rufo, ad apicem smaragdino.

DESCRIP^TIO. Corpus minutum, Colibri ornato simile; differt vero ab hoc plumis fasciculi collaris non filiformibus nec ferrugineis sed latioribus, brevioribus albisque; dorsum infimum transverse albo-fasciatum; remiges fuscae; cauda rufa, alas non exsuperans, rectricibus 2 intermediis viridi-aureis, exterioribus ad vexillum externum viridi-marginalis; crissum rufescens; regio circa anum sordide albescens; rostrum capite vix longius, rufescens, ad apicem nigricans, compressum. Longitudo corporis 5', caudae $1\frac{1}{3}$ ', c. alis l. 4'', rostri 6''.

SPECIES 6. COLIBRI MYSTAX. TAB. LXXXII. Fig. 3.

Mediocris, supra et subtus viridi-aureus; fronte jugloque smaragdino-reluentibus; pennis $\frac{3}{4}$ ' infra aures prominentibus, gradatis, subfiliformibus, viridi-aureis, albo-ocellatis, ad apicem truncatis; cauda cupreo-chalybea, aequali.

DESCRIP^TIO. Corpus subrobustum, viridi-aureum; stria ab angulo oris ad mystacem nigra; collum anticum albidum, fusco-maculatum; pectus et abdomen laterale viridi-aurea; abdomen intermedium crissumque cinerascentia, nigro substriata; regio circa anum alba; fascia dorsi insimi fulva; uropygium violaceo-cupreum; remiges cauda breviores, subviolaceae; rostrum nigrum, capite vix longius. Longitudo corporis $3\frac{1}{2}$ ', caudae $1\frac{1}{2}$ ', e. alis l. 6'', rostri 7''.

Habitat in campis sylvestribus St. Pauli; differre videtur a Trochyllo chalybeo Temminkii corpore subtus non brunnescente nigroque fasciato.

Dendrocolaptes.

Gressorii, scansores, insectivori, picorum instar volantes, taciturni, agiles; cauda longiuscula, vel molli, vel rigida et scandendo detrita, reetricibus intermediis frequenter caeteris nonnihil longioribus; digitis 3 anticus, 1 postico, duobus anter. exterioribus vel ad basin connatis aequalibus vel lateralibus aequalibus; tarsis medioeribus; rostro frequenter arcuato vel subulato, lateraliter compresso, ad basin non depresso, ad apicem non emarginato; naribus vel oblongis vel longitudinalibus, membrana tectis; vibrissis nullis; aliis breviusculis; lingua brevi, acuta.

GENUS I. SPHENURA.

Rstro longiore, subulato, vix arcuato, subcylindrico, ad apicem obtuso; nuribus rotundioribus; digitis ad basin connatis; cauda molliore, detrita; digitis anticus lateralibus inaequalibus.

SPECIES 1. SPIENURA SUBULATA. TAB. LXXXIII. Fig. 1.

Fusco-brunnea; corpore subtus pallide rufescente, capite, nec non dorso albo striatis; canda rufa; gula ochraceo-alba.

DESCRIP^TIO. Corpus Paro coeruleo vix minus, supra brunneum; caput nigricans, fulvo-strigilatum; macula auricularis brunnea, fulvo-strigilata; dorsum anterius sub-



SPHENURA, *subulata* & *striolata*.

Tab LXXXIII.



ANABATES *cristatus*.

Tab. LXXXIV.

violaceo-brunneum, fulvo substriatum; gula ochracea; collum subtus, pectus abdomenque pallide rufescens, albo maculata; femora crissumque brunnea; remiges rufobrunneae, vexillo interno nigricante, fulvo-marginato; alae subtus ochraceae; cauda laete rufa, longiuscula, mollis, ad apicem detrita; rostrum pallide flavicans; pedes flavidio-albescentes; oculi grisei. Foem. Longitudo corporis $5\frac{3}{4}$ ', caudae $2\frac{1}{2}$ ', c. alis l. $1\frac{1}{2}$ ' rostri 1', tarsi 9".

Habitat in sylvis fl. Amazonum. Sp. 1.

GENUS II. ANABATES.

Rstro breviusculo, subulato, ad latera compresso, rectiusculo; maxilla inferiore ad apicem oblique ascende; digitis non externis sed lateralibus acqualibus, frequenter fissis; naribus basalibus, linearibus, longitudinalibus, membrana tectis; cauda longiuscula, molli, frequenter scandendo detrita, inaequali; rictu oris usque ad oculos elongato.

SPECIES 1. ANABATES (SPENURA) STRIATUS. TAB. LXXXIII. Fig. 2.

Brunneo-rufus rufoque fulvo strigilatus supra, subtus cinereo rufescens, fulvo-albo strigilatus, gula caudaque ferrugineo-ochraceis.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine praecedentis; caput tectricesque alarum rufescenti-ferrugineo strigilata, plumis capitatis nigro-marginatis; macula auricularis, collum subtus, pectus abdomenque olivaceo-brunneoscentia, fulvo-albo striata; gula caudaque ferrugineo-ochraceae; axillae fulvae; remiges brunneo-rufae, vexillis interioribus apiceque nigricantibus, ad basin ochraceis; ala subtus antice ochracea; crissum brunneum; rostrum nigricans, ad apicem albicans; pedes coeruleo-cinerei. Longitudo corporis $6\frac{1}{2}$ ', caudae $5\frac{1}{3}'$ c. alis l. $2\frac{1}{4}"$, rostri 10".

Habitat in sylvis campestribus Bahiae.

SPECIES 2. ANABATES CRISTATUS. TAB. LXXXIV.

Majusculus, supra et subtus rufus; capite breviter cristato; remigibus ad apicem nigrescentibus.

DESCRIP^TIO. Corpus Merula minus, totum rufum; synciput rufum, cinereo-obdutum; crista capitatis brevis, dependens, plicatilis; remiges rufae, vexillo interno api-

ceque nigris, ad basin ruso-marginatis; rostrum illi Pici simile sed compressiusculum, nigricans, maxilla inferiore subbreviore; pedes nigro-coerulei; oculi flavidi; cauda longa, rufa; digiti fissi. Longitudo corporis $8\frac{1}{4}'$, caudae $3\frac{2}{3}'$, c. alis I. $2\frac{1}{2}'$, rostri $15''$, tarsi $1\frac{1}{3}'$.

Habitat prope pagum Malhadam ad flumen St. Francisci, mas a foemina non diversus. Sp. 2.

SPECIES 5. ANABATES RUFIFRONS. TAB. LXXXV. Fig. 1.

Minor, olivaceo-cinerascens supra, subtus albicans; fronte castanea; stria a naribus super oculos alba.

DESCRIP^TIO. Corpus habitu syliae, supra brunneo-cinerascens; caput ad verticem nigricans, ad frontem castaneum; macula auricularis cinerea; gula corpusque subtus totum intermedium alba, lateraliter dilute brunnea; humeri maris remigesque olivaceo-brunnei, medio rufescentes; axillae albidae; alae subtus antice ochraceae; cauda olivaceo-brunnescens, foeminae nigro obscure fasciolata, inaequalis, ad apicem non detrita; rostrum breve, subcompressum, supra convexum, nigrum, maxilla inferiore ad basin alba; pedes cinerascentes. Longitudo corporis $5\frac{1}{3}'$, caudae $2\frac{1}{2}'$, c. alis I. $1\frac{2}{5}'$, rostri $8''$, tarsi $8''$

Habitat in campis Minas Geraes, nidum in arboribus brevibus $3^{\circ} - 4^{\circ}$ libere et deorsum pendente e ramis columbarum instar construens ac praecedenti aliud quovis anno superstruens; foemina alis medio minus rufescens. Sp. 2.

GENUS III. SYNALLAXIS.

Sylviaeformis, scandens; rostro tenui, breviore, ante apicem compresso, margine introrsum verso; naribus longitudinalibus, membrana obtectis; canda molli, ad apicem detrita.

SPECIES 1. SYNALLAXIS RUFICAUDA. TAB. LXXXV. Fig. 2.

Minor, supra castaneus, subtus albus; gula flava; lateribus pectoris hypochondriisque cinerascentibus; rostro tenui, nigro, cauda castanea, ad apicem detrita.

DESCRIP^TIO. Corpus gracile magnitudine et habitu syliae, supra castaneum; macula auricularis albo-cinerascens; dorsum foeminae olivaceo-rufum; remiges casta-



ANABATES rufifrons. SYNALLAXIS ruficauda

Tab LXXXV.



PARVILLUS ruficeps 1. Mas 2. Fem

Tab LXXXVI.

neae, ad apicem nigrantes; axillae albae; alae subtus antice ochraceae; rostrum rectum, tenui, illi sylviae fere simile, apice obliquum; alae caudaque laete rufo-castaneae; pedes plumbei. Longitudo corporis $5\frac{1}{3}$ ', caudae $2\frac{3}{4}'$, c. alis l. $2'$, rostri $10''$, tarsi $9''$.

Habitat in sylvis provinciae Rio de Janeiro. Sp. 2.

GENUS IV PARULUS.

Paro similis; alis brevissimis; cauda longiore, gradata; rostro tenui, brevi, ad apicem subarcuato; maxilla inferiore compressa, apice ascendentem; naribus longitudinalibus, membrana obtectis.

SPECIES 1. PARULUS RUFICEPS. TAB. LXXXVI. Mas. 1. Fem. 2.

Minor; dorso olivaceo; capite tectricibusque alarum rufo-ferrugineis; gula nigro-variegata; abdomine medio albicante.

DESCRITIO. Corpus magnitudine pari caudati; caput supra, tectrices alarum caudaque foeminae ferruginea; dorsum, caput laterale, nucha ac hypochondria olivaceo-fusca; remiges brevissimae, barba externa ferruginea, interna apiceque nigrantis-fuscis; alae subtus antice rufo-ochraceae; gula foeminae alba; jugulum nigro-variegatum, maris nigerrimum; frons et pectus maris cinereo-, foeminae cinereo-albida, fronte maris ferruginea; abdomen totum foeminae, intermedium maris albidum; stria super oculos foeminae alba; cauda longa, acuta, foeminae rufa, maris cinerea, rectricibus intermediis longioribus; rostrum motacillaformem, tenuem, acutum, supra nigrum, infra albicans; pedes cinerei. Longitudo corporis $6'$, caudae $3\frac{1}{3}'$, c. al. l. $2\frac{3}{4}'$, rostri $7''$

Habitat in campis fluminis St. Francisci; foemina differt a mare fronte cinerea, cauda rufa, gula alba, striga supra oculos alba; mas variat maxilla superiorē longiore. Sp. 2.

GENUS V. DENDROCOLAPTES.

Piciformis, scisor, insectivorus; digitis gressoriis, 3 anticis, 1 postico, 2 exterioribus aequalibus; rostro longiore, lateraliter compresso, arcuato, cultrato, supra acute carinato; naribus basalibus, rotundis; cauda rigida, scansum adjuvante, detrita; scapis validis, rectricibus intermediis sublongioribus; rictu oris usque oculos elongato.

SPECIES 1. DENDROCOLAPTES DECUMANUS. TAB. LXXXVII.

Maximus, cinnamomeus; rostro longo, lateraliter compresso, arcuato; capite, collo pectoreque fulvo-albo strigilatis; humeris subtus, abdomine crissaque fulvo nigroque fasciolatis; gula juguloque albis.

DESCRIP^TIO. Corpus magnitudine Pici viridis, supra immaculate cinnamomeum; caput nigricans collumque fulvo-albo strigilata; genae albidae; macula superauricularis fulvo-albescens; barba maxillae iuferioris lateraque colli fusco-brunnea; gula jugulumque immaculate alba; pectus cinnamomeum, fulvo-albo longitudinaliter angulateque large strigilatum; abdomen, crissum nec non femora, axillae regioque subhumeralis fulvo nigroque fasciolata; dorsum olivaceum, alae et hypochondria immaculate cinnamomea; remiges ruso-cinnamomeae, ad apicem fuscantes, subtus ferrugineae; cauda rigida, cinnamomea, scapis largis, ad apicem aenatis; rostrum ad apicem et ad basin compressum, arcuatum, nigrum; pedes coeruleentes. Longitudo corporis 11', caudae 4 $\frac{3}{4}$ ', e. alis l. 5 $\frac{1}{4}$ ', tarsi 1', rostri 2'

Habitat Arapaçu dictus in Brasilia, D. Platirostre major rostroque longiore, ad basin non depresso ab illo diversus.

SPECIES 2. DENDROCOLAPTES FALCIROSTRIS. TAB. LXXXVIII.

Major, ruso-cinnamomeus; capite, collo, corpore subius crissaque olivaceo-brunneis, albo-strigilatis; stria a genis ad aures fulva; collo laterali cinnamomeo; capite colloque tenuiter albo-strigilatis; rostro maxime compresso, cinerascente; gula sordide albida.

DESCRIP^TIO. Corpus praecedente parum minus, ruso cinnamomeum; caput collumque brunneo-fusca, albo obscure strigilata; stria a genis supra aures fulva; collum laterale femorae brunescentia; pectus, abdomen crissumque ruso-brunescentia, albo large strigilata, nigro non fasciata; abdomen intermedium humerique



DENDROCOLAPTES Decumanus
Picacule rayé.

Tab. LXXXVII.



DENDROCOLAPTES falcirostris.

Tab LXXXVIII



DENDROCOLAPTES *platyrostris*

Tab. LXXXIX



DENDROCOLAPTES bivittatus. 2. Wagleri

Tab. XC

ochracei, subtus fusco-punctati; tectrices alarum humerales olivaceo-rufae; remiges castaneae, ad apicem vix fuscescentes; cauda castanea, scapis rigidis, largis, ad apicem acutis; pedes nigro-coerulecentes. Longitudo corporis $10\frac{1}{2}'$, caudae $4\frac{3}{4}'$, c. alis l. $2\frac{3}{4}'$, rostri 2'

SPECIES 5. DENDROCOLAPTES PLATYROSTRIS. TAB. LXXXIX.

Major, olivaceo-brunneus; rostro breviusculo, ad nares maxillamque inferiorem depresso, latiusculo; gula colloque laterali fulvo-albis; macula auriculari capiteque nigris, albo-strigilatis; pectore, nec non dorso fulvo-strigilatis; abdomine crissaque fulvo nigroque fasciolatis; remigibus caudaeque castaneis.

DESCRITIO. Corpus D. Decumano minus, supra et subtus olivaceo-brunneum; caput nigrum, plumis medio large fulvo strigilatum; regio circa oculos, collum laterale, gula jugulumque fulvido-alba; dorsum olivaceo-rufum, albo-substrigilatum; pectus albo-strigilatum, nec non fusco-punctatum abdomenque fulvo nigroque fasciolatum olivaceo-brunnea; humeri subtus fulvo nigroque fasciolati; remiges, uropygium caudaque castanea; rectrices rigide, ad apicem acutae; rostrum illi Tainnochili simile, planiusculum, supra carinatum, ad apicem dentatum; pedes nigro-coerulei. Longitudo corporis $9\frac{1}{2}'$, caudae $4\frac{1}{2}'$, c. alis l. 3', rostri $1\frac{1}{2}'$, tarsi 1'.

Habitat in sylvis Rio de Janeiro, mas magis rufescens. Sp. 2.

SPECIES 4. DENDROCOLAPTES BIVITTATUS. TAB. XC. Fig. 1.

Mediocris, castaneo-rufus supra; corpore subtus vittisque 2 a rostro ad occiput rufescenti-fulvis; capite fusco, fulvo strigato; rostro angusto, arcuato.

DESCRITIO. Corpus Alanda arvensi majus, supra castaneo-rufum, subtus ochraceum; caput nigrans, fulvo-strigilatum; stria a naribus super oculos ad occiput fulva; alia per oculos ad aures nigra; gula regioque infra aures fulvo-albicantes; alae, cauda crissumque castanea; axillae ochraceae; rostrum compressum, longum, album; pedes coeruleo-albidi. Longitudo corporis 8'; caudae 3' c. alis l. $1\frac{1}{2}'$, rostri $1\frac{3}{4}'$, tarsi 10".

Habitat in campis sylvestribus Piauhy, mas a foemina vix diversus (Azar. Nro. 242). Sp. 2.

SPECIES 5. DENDROCOLAPTES WAGLERI. TAB. XC. Fig. 2.

nor, rufo-castaneus supra, subtus albicans, plumis fusco fimbriatis; capite vix, nucha non rufomaculata; rostro ensiformi, tenui, arcuato.

DESCRIPTIO. Corpus magnitudine Fringillae, supra castaneum, subtus totum albinum, plumis fusco-marginatis; caput castaneum, ferrugineo substrigilatum, fronte subcaerulea; regio supra aures albo-maculata; gula alba; dorsum, remiges caudae castaneae; axillae albescentes; hypochondria nigro-cinerea; rostrum maxime compressum, parvum, album, ad nares planiusculum; pedes nigri. Longitudo corporis $6\frac{2}{3}'$, idae $5'$ c. alis l. $1\frac{1}{3}'$, rostri $1\frac{1}{4}''$, tarsi $8''$. Sp. 1.

SPECIES 6. DENDROCOLAPTES OCCELLATUS (GUTTATUS).

TAB. XCI. Fig. 1.

Minor, olivaceo-castaneus; rostro fere recto, non aduncus, parum compressus; gula ochracea; jugulo maculis ochraceis ocellato fuscoque fimbriato; capite, nucha pectoreque fulvo-strigilatus; macula auriculari crista, fulvo-strigilata; collo antico ochraceo-guttato.

DESCRIPTIO. Corpus Dendrocolapte guttato ac Pico minus; dorsum immaculatum corpusque subtus olivaceo-ferruginea; alae subtus fulvae; remiges caudae castaneae, rectricibus intermediis ad apicem acutis; rostrum olivaceo-fuscum, subarcuatum; pedes fusco-albidi. Longitudo corporis $7'$, cauda $5\frac{1}{3}'$, c. alis l. $2'$, rostri $1\frac{1}{3}'$.

Habitat in sylvis campestribus Piauhy; differt a D. guttato corpore minore, rostro non aduncus, jugulo non squamoso, a D. Pico pectore non late albo, rostro minus recto, juguloque non albo sed fulvo. Sp. 2.

SPECIES 7. DENDROCOLAPTES TENUIROSTRIS.

TAB. XCI. Fig. 2.

Minor, castaneus; rostro cylindrico, arcuato; gula brevipenni, immaculata fulva; capite fulvo-ocellato; occipite albido-maculato; nucha, collo, pectorc abdomenque oblonge et latissime fulvo-maculata; macula auriculari periophthalmisqne fulvis, nigro-variegatis; cauda lacte rufa.

DESCRIPTIO. Corpus praecedente nonnihil minus; caput fuscum, ocellatum; dorsum corpusque subtus olivaceo-rufescens, albo large strigilata; tectrices alarum olivaceo-castaneae; remiges castaneae, vexillo interno nigricante; rostrum supra fuscum, subtus flavidum; pedes coerulecentes. Longitudo corporis $6\frac{1}{4}'$, cauda $2\frac{1}{2}'$, c. alis l. $1\frac{1}{2}'$, rostri $1'$. Sp. 1.



DENDROCOLAPTES. 1. *guttatus*. 2. *tenuirostris*. 3. *cuneatus*.

Tab.XCI

SPECIES 8. DENDROCOLAPTES CUNEATUS. TAB. XCI. FIG. 3.

Minimus, cinnamomeus, subtus olivaceo-brunneus; rostro nigro, brevi, recto, ad basin planiusculo, convexo, ad apicem obtuso; capite vix, pectore fulvo-strigato; jugulo fulvo-maculato; cauda laete castaneo-rufa; remigibus fuscis, brunneo marginatis; scapis caudae ad apicem elongatis, rigidis, curvis.

D E S C R I P T I O. Corpus magnitudine Paruli, supra rufo-, subtus olivaceo-brunneum; vexillum remigum internum fuscum, medio fulvum; alae subtus antice albidae; rostrum illi Anabatis subsimile. Longitudo corporis $6\frac{1}{5}$ ', caudae $2\frac{3}{4}'$, c. alis l. $1\frac{2}{3}'$, rostri 7".

Habitat Paraë. Sp. 1.

SPECIES 9. DENDROCOLAPTES CAYENNENSIS. Buff. pl. 621.

Maximus, castaneus, supra et subtus ferrugineo-fulvo nigroque fasciatus; rostro fusco, valido, vix compresso, subarcuato, ad nares subdepresso, ad apicem subaduncus, dentato; remigibus caudaque castaneis. Longitudo corporis $10\frac{3}{4}'$, caudae $4\frac{1}{4}'$, c. alis l. $2\frac{3}{4}'$, rostri $1\frac{3}{4}'$. Sp. 1.

SPECIES 10. DENDROCOLAPTES GUTTATUS. Lichtenst.

Mediocris, olivaceo-castaneus; rostro compresso, subarcuato, nigro, subaduncus; gula immaculata ochracea; capite toto, nucha, dorso anteriore, magis adhue collo ante pectoraque ochraceo-strigatis; abdomine immaculata ferruginea; tectricibus axillaribus pallide fulvis.

D E S C R I P T I O. Corpus Dendrocolapte Pico, nec non turdino majus, supra rufo-castaneum, subtus ferrugineum; strigae capitis, colli pectorisque longae, ochraceae; remiges totae castaneae, barba exteriore apiceque pallidioribus; humeri subtus ferruginei; cauda fusco-castanea, rectricibus ad apicem acutis; rostrum supra nigricans, subtus flavicans, ad apicem subaduncum. Longitudo corporis $8\frac{1}{5}'$, caudae $3\frac{3}{4}'$, c. alis l. $2\frac{1}{3}'$, rostri $1\frac{1}{2}'$.

Habitat in sylvis provinciae Rio de Janeiro. Sp. 1.

SPECIES 11. DENDROCOLAPTES TURDINUS.

Lichtenst. T. 2. Fig. 1.

Mediocris, olivaceo-brunneus, immaculatus; rostro breviusculo, largiore, rectiusculo, ad apicem adunco, non dentato, supra nigro, subtus albido; capite colloque subtus ferrugineo substrigilatis; coda castanea; dorso, pectore abdomineque brunneis, non strigilatis; alis fusco-brunneis, subtus antice ferrugineis.

DESCRIP^TIO. Corpus Dendr. Cayennensi duplo minus, eodem vero colore, gula modo non nihil ferruginea. Habitat in sylvis provinciae Rio de Janeiro. Longitudo corporis $\frac{7}{3}'$, caudae 5', c. alis l. $1\frac{1}{2}$, rostri 1'.

SPECIES 12. DENDROCOLAPTES PICUS. Buff. pl. 605.

Mediocris, cinnamomeus; rostro albo, recto, compresso, ad basin valido, apice mandibulae inferioris ascende; capite fusco abdomineque olivaceo-rufo albo-strigilatis; gula alba; jugulo fulvo-albo, plumis fusco subfimbriatis ac variegatis; pectore albidiore nec non nucha oblonge squamoso-albo maculatis; macula auriculari crispa, albo-strigilata; stria pone aures genisque albis,

DESCRIP^TIO. Corpus Dendrocolapte guttato minus, Dendr. ocellato vero majus, pectore squamoso - albo rostroque recto; remiges castaneae vix fuscae, ad basin ochraceae; crissum rufescens, albo substriatum; rectrices ad apicem acutae; pedes argentei; oculi nigri. Longitudo corporis $\frac{7}{4}'$, caudae 5', c. alis l. 2', rostri $1\frac{1}{3}'$.

Habitat in sylvis campestribus Bahiae. Sp. 4.

I N D E X.

T O M U S I.

A V E S T E R R E S T R E S.

FALCONES.		PAGINA	1	TABULA	1
CATHARTES	Papa. Fœm.	—	2	—	"
	Aura	—	2	—	"
	Ruficollis	—	3	—	1 ^a
POLYBORUS	vulgaris s. Caracara Juv.	—	4	—	1 ^b
AQUILA	Urubitinga. Mas.	—	5	—	1 ^c
	picta	—	5	—	1 ^d
	milvoides	—	5	—	1 ^d
	Buson	—	5	—	"
CYMINDIS	Leucopygus	—	7	—	2
HARPYA	braccata	—	7	—	3
	ornata	—	8	—	
ASTUR	cachinnans	—	8	—	3 ^a
	Brachypterus	—	9	—	
	cayennensis	—	13	—	8 ^c
BUTEO	plumbeus	—	12	—	8 ^b
GYMNOPS	strigilatus	—	10	—	4 ^a
	aterrimus	—	11	—	
	fasciatus	—	10	—	4
	aquilinus	—	11	—	
MILVAGO	ochrocephalus	—	12	—	5
BIDENS	Rufiventer	—	14	—	6
	Albiventer	—	14	—	7
	cinerascens (femoralis)	—	15	—	8
	Sparvcius	—	16	—	
FALCO	insectivorus	—	17	—	8 ^a
	Magnirostris	—	18	—	
	femoralis	—	18	—	
	Xanthothorax	—	19	—	
	nitidus	—	19	—	
	dominicensis	—	16	—	
	aurantius	—	17	—	
STRIGES.					
STRIX	Longirostris	—	20	—	9 ^a
	flammea	—	21	—	
	Grallaria	—	21	—	
	crucigera	—	22	—	9
	albomarginata	—	23	—	10 ^a
	undulata	—	23	—	10
PSITTACI.					
AODORHYNCHUS	Maximiliani Bavariae Regis	—	48	—	11
ARATINGA	Carolinae Bavariae Reginae	—	29	—	12

		PAGINA	29	TABULA	13
ARATINGA	haemorrhous	—	30	—	14
	Chrysocephalus	—	30	—	14 ^a
	luteus s. Guarouba	—	31	—	15. 2
	Xanthopterus	—	32	—	15. 1
	Acutirostris	—	32	—	16
	Aurifrons. M. F.	—	33	—	17
	Cyanogularis. M.	—	33	—	13
	Flaviventer. M. F.	—	34	—	19. 1
	Caixana	—	34	—	19. 2
	Ninus	—	35	—	20
	perlatus. M. F.	—	35	—	21
	fasciatus. M. F.	—	36	—	22
	Melanurus. M. F.	—	37	—	
	Guianensis s. nobilis	—	"	—	
	aureus	—	"	—	
	pertinax	—	"	—	
	virescens	—	"	—	
ARARA	hyacinthinus	—	25	—	23
	purpureo-dorsalis	—	26	—	24
	Macrognathos. M. F.	—	26	—	25
	Macao	—	27	—	
	Aracanga	—	27	—	
	Ararauna	—	28	—	
	severus	—	"	—	
	Macawuana	—	"	—	
PSITTACUS	Xanthops	—	39	—	26
	columbinus	—	40	—	27
	malachitaceus	—	40	—	28
	Pumilo	—	41	—	29. 2
	Maitaca. M.	—	41	—	29. 1
	Maitaca. F.	—	41	—	50
	Flavirostris	—	42	—	31. 2
	senilis	—	42	—	31. 1
	Diadema	—	43	—	52
	accipitrinus	—	44	—	32 ^a
	pulverulentus	—	43	—	
	festivus	—	44	—	
	aestivus	—	44	—	
	amazonicus	—	45	—	
	Barraabandi	—	"	—	
	menstruus	—	46	—	
	purpureus	—	"	—	
	Melanocephalus	—	"	—	
PSITTACULUS	passerinus. M. F.	—	38	—	35. 1. 2
	Xanthopterygious. M. F.	—	"	—	34. 1. 2
	gregarius. M. F.	—	39	—	34. 3. 4
	Tui	—	39	—	

CUCULI.

		PAGINA	47	TABULA	35
TROGON	pavoninus	—	47	—	36
	aurantius	—	48	—	37
	castaneus	—	48	—	38
	sulphurcus. M. F.	—	49	—	38 ¹
	variegatus	—	49	—	
	Cucuini vel strigilatus	—	49	—	
	violaceus	—	50	—	
	viridis	—	"	—	
	collaris	—	"	—	
CYPHOS	Macrodactylus	—	51	—	39. 2
BUCCO	Rubecula	—	51	—	39. 1
	striatus	—	52	—	40. 2
	rufus	—	52	—	40. 1
	Nigrifrons	—	53	—	43. 2
	Leucops	—	"	—	43. 1
MACROPUS	Phasianellus	—	53	—	42
	Caixana. M. F.	—	54	—	43
GALBULA	albogularis	—	55	—	47. 1
	tombacea. F.	—	—	—	48
	tridactyla	—	"	—	47. 2

PICI.

Picus	robustus	—	56	—	44
	Albirostris. M. F.	—	56	—	45
	campestris	—	57	—	46
	Jumana. M. F.	—	"	—	47
	lineatus. M. F.	—	58	—	48
	flavescens. M. F.	—	"	—	49
	dominicanus. M. F.	—	59	—	50
	ochraceus	—	"	—	51. 1
	flavicans. F.	—	60	—	51. 2
	Flavifrons F.	—	60	—	52
PICULUS	Macrocephalus	—	60	—	53. 2
	guttatus	—	61	—	53. 1
	Rubrifrons. M. F.	—	61	—	55
	Icterocephalus. M. F.	—	62	—	54
	Maculifrons	—	62	—	56. 1
	Ruficeps. M. F.	—	63	—	56. 1. 2

PICAE.

CORACINA	ornata	..	63	—	50
PRIONITES	Martii	—	64	—	60
CASSICUS	bifasciatus	—	65	—	61
	Angustifrons	—	66	—	62
	nigerrimus	—	"	—	63
ICTERUS	minor	—	67	—	"
	Sulcirostris	—	"	—	64
	tanagrinus	—	"	—	"
	fringillarius. M. F.	—	68	—	65

			PAGINA	69	TAVOLA	66
			—	63	—	67
T U R D I.						
TURDUS	citrinus		—	69	—	67
	Chrysocephalus		—	70	—	68
			—	"	—	69
			—	71	—	70
			—	"	—	71
MYOTHERA	Ruficeps		—	72	—	72
	Leuconota		—	"	—	"
	Coraya		—	73	—	73
PHILYDOR	superciliaris		—	"	—	"
	albogularis. M. F.		—	74	—	74
	Ruficollis		—	"	—	75
ALAUDA	(Anthus) Chii		—	75	—	76
	Breviunguis		—	"	—	"
FIGULUS	albogularis. M. F.		—	76	—	78
C E N T H I A E.						
CAMPYLORHYNCHUS	scolopaceus		—	77	—	79
	striolatus		—	"	—	"
TROCHILUS	pygmaeus		—	78	—	80
	Brevicauda		—	79	—	"
GRYPUS	Ruficollis		—	"	—	"
COLIBRI	crispus		—	80	—	81
	hirundinaceus		—	"	—	"
	Leucopygus		—	81	—	"
	albogularis		—	"	—	82
	Helios		—	"	—	"
	Mystax		—	82	—	"
D E N D R O C O L A P T E S.						
SPHENURA	subulata		—	82	—	83
	striata		—	83	—	"
ANABATES	cristatus		—	83	—	84
	Rufifrons		—	84	—	85
SYNALLAXIS	Ruficauda		—	"	—	"
PARULUS	Ruficeps. M. F.		—	"	—	86
DENDROCOLAPTES	Decumanus		—	86	—	87
	Falcirostris		—	"	—	88
	Platyrostris		—	87	—	89
	bivittatus		—	"	—	90
	Wagleri		—	88	—	"
	ocellatus (guttatus)		—	"	—	91
	tennirostris		—	"	—	"
	cuneatus		—	89	—	91
	cayennensis		—	"	—	"
	guttatus		—	"	—	"
	turdinus		—	90	—	"
	Picus		—	"	—	"

